Thrombocid Forte
5mg/g Pomada

Nuevo formato de 100g




Una gran oportunidad

Líderes

Tras muchos años en el mercado, Thrombocid sigue siendo el líder en el segmento de los antivaricosos gracias a la confianza de sus usuarios.

Fuente: IQVIA Tam, junio 2020




Oportunidad de mercado

Vimos que había personas con varices que no tenían una versión pensada para ellas. Personas que, al tener que tratarse con un masaje de Thrombocid todos los días, necesitaban un formato de tamaño superior.

Formato de tamaño superior

Para todas ellas lanzamos un formato más grande con el que ayudarlas en su alivio diario.



Apoyo en comunicación

Apoyaremos el lanzamiento con una gran campaña en televisión, redes sociales y punto de venta.



Spot










Materiales de punto de venta

Posología

Aplicar 3 o 4 veces al día una fina capa de pomada a lo largo de la zona afectada, distribuyéndolo con un suave masaje.



Masaje de abajo hacia arriba

Indicaciones

- Alivio eficaz de la pesadez y tirantez en piernas con varices en adultos desde la primera aplicación.
- Alivio de hematomas superficiales producidos por golpes en adultos y niños mayores de 1 año.

Composición Thrombocid Forte: 5mg/g pentosano polisulfato sódico.

Formatos en 60g y **100g (NUEVO)**



NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Thrombocid Forte 5 mg/g pomada. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Cada gramo de pomada contiene: Pentosano polisulfato sódico 5 mg. Excipientes: Alcohol cetoestearílico 144 mg. Propilenglicol 50 mg. Parahidroxibenzoato de metilo (E218) 1,3 mg. Parahidroxibenzoato de etilo (E214) 1,3 mg. Ver epígrafe lista de excipientes. **FORMA FARMACÉUTICA:** Pomada de color blanco. **DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas:** Tratamiento local sintomático de los trastornos venosos superficiales como pesadez y tirantez en piernas con varices en adultos y de hematomas superficiales producidos por golpes, en adultos y niños mayores de 1 año. **Posología y forma de administración:** Uso cutáneo. Adultos y niños mayores de 1 año: aplicar 3 o 4 veces al día una fina capa de pomada a lo largo de la zona afectada, distribuyéndola con un suave masaje. De ordinario no hace falta vendaje, pero puede cubrirse con una gasa o compresa si es necesario. Niños menores de 1 año: no se ha establecido la seguridad y eficacia de Thrombocid Forte en niños menores de 1 año. Si los síntomas persisten más de 5 días o se produce irritación o empeoramiento, deberá evaluarse la situación clínica del paciente. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquiera de los componentes de este medicamento. Pacientes con manifestaciones hemorrágicas o alteraciones importantes de la hemostasia. No aplicar nunca sobre las mucosas, úlceras y heridas abiertas o infectadas. **Advertencias y precauciones especiales de empleo:** Utilizar sólo en piel intacta. Evitar el contacto con los ojos. En caso de problemas venosos de origen trombótico (como por ejemplo tromboembolismo) se recomienda aplicar el producto suavemente y sin masaje. No utilizar de forma prolongada ni en zonas muy extensas de la piel. Valorar situación clínica si el paciente sufre de alguna otra dolencia, es alérgico o está utilizando algún otro medicamento. **Advertencias sobre excipientes:** Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetoestearílico. Este medicamento puede producir irritación de la piel porque contiene propilenglicol. Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de metilo (E218) y parahidroxibenzoato de etilo (E214). **Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:** Aunque no se ha descrito hasta el momento ninguna interacción medicamentosa con el uso cutáneo de este medicamento, el médico o farmacéutico deberían valorar su utilización conjunta con otros fármacos aplicados por esta vía. **Fertilidad, embarazo y lactancia:** No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de pentosano polisulfato sódico en mujeres embarazadas o en período de lactancia. Los estudios realizados en animales son insuficientes en términos de toxicidad para la reproducción. No se recomienda utilizar Thrombocid Forte durante el embarazo. **Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:** La influencia de Thrombocid Forte sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. **Reacciones adversas:** Se han notificado las siguientes reacciones adversas. Se muestran de acuerdo a MedDRA, Clasificación Órgano-Sistema y por frecuencia estimada. Las frecuencias se definen como: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100, <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000, <1/100); raras (≥1/10.000, <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Clasificación de órganos: Trastornos del sistema inmunológico. Frecuencia estimada: Muy rara. Efectos adversos: Hipersensibilidad. En caso de observarse la aparición de reacciones adversas debe suspenderse el tratamiento y notificarlas a los sistemas de Farmacovigilancia. **Sobredosis:** Siguiendo correctamente las instrucciones descritas en las indicaciones y la posología, es muy difícil que aparezcan signos o síntomas de intoxicación. En el caso de ingestión accidental del contenido del tubo, se recomienda beber una buena cantidad de agua u otro líquido acuoso y, si aparecieran trastornos digestivos, acudir a un centro hospitalario y aplicar tratamiento sintomático. **DATOS FARMACÉUTICOS:** Lista de excipientes: Alcohol cetoestearílico, Cetomacrogol 1000, Glicerol (E422), Propilenglicol, Oleato de decilo, Fenoxietanol, Parahidroxibenzoato de metilo (E218), Parahidroxibenzoato de etilo (E214), Agua. **Incompatibilidades:** No procede. **Naturaleza y contenido del envase:** Tubos de aluminio conteniendo 60 g y 100 g de pomada. **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** LACER, S.A., C/. Sardenya, 350, 08025 Barcelona (España). Medicamento no sujeto a prescripción médica. **FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Noviembre 2001.**