Dientes preparados para disfrutar

Alivio rápido y duradero
contra la sensibilidad dental
desde la **primera aplicación***

NUEVA IMAGEN





NUEVA FÓRMULA

Lacer
Bocas sanas

(*) Estudios clínicos internos realizados con dentífrico y gel bioadhesivo

SensiLacer®

Sensibilidad Dental

- **Alivio rápido** de la sensibilidad dental.
- **Repara y protege** el esmalte dental.
- **Protege y fortalece** la dentina expuesta.
- **Uso diario.**

Acción desensibilizante rápida y eficaz.
Disminuye la sensibilidad de los dientes frente al frío, calor, dulces u otros estímulos.

Acción remineralizante. Repara, protege y fortalece el esmalte dental, previniendo la aparición de la sensibilidad dental. Su contenido en flúor potencia el efecto desensibilizante.

Efecto oclusivo sobre las zonas sensibles de los dientes para ayudar en la prevención de la sensibilidad dental.


Indicado para aliviar la sensibilidad dental después de la higiene o blanqueamiento efectuados en la clínica dental.

Idóneo para emplear después de **tratamientos periodontales,** así como en caso de **retracción gingival y pérdida del esmalte** ocasionadas por bruxismo, dietas ricas en ácidos o abrasión excesiva durante el proceso de cepillado.

Colutorio

Liberación de flúor de forma inmediata y sostenida al contener fluoruro sódico (1400 ppm).[18]


Mayor efectividad que otros enjuagues en la reparación y protección del esmalte.[19]



Reducción del 66% en la viabilidad del biofilm multiespecie (*Streptococcus mutans, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis y Prevotella intermedia*).

Estudio clínico:


- A las 24 horas ya hay una reducción estadísticamente significativa de la sensibilidad dental (p<0,05).
- A las 4 semanas la reducción de la sensibilidad dental alcanza el 58,8% (p<0,05).



SensiLacer Colutorio incorpora a su fórmula copolímero PVM/MA, con capacidad oclusiva de los túbulos dentinarios de larga duración.

Pasta dentífrica

**In Vitro* Study to Compare the Ability of Two Toothpaste Formulations to Visually Occlude Dentine Tubules Over Fifteen Successive Days of Treatment. 62-LAB-SEM-24-001.Intertek (Jun 24' - Ag'24)




85% de túbulos dentinarios ocluidos **a las 2 semanas.**

Estudio *in vitro*. Día 15.

Abrasividad muy baja: **RDA 25.**

Gel bioadhesivo

*Evaluación de la eficacia y tolerabilidad de SensiLacer gel bioadhesivo para el cuidado bucal en sujetos con dientes sensibles bajo control odontológico (N=31. Data on file, Junio 2024.)



90% de túbulos dentinarios ocluidos **en 7 días** de uso.

Estudio *in vitro*. Día 7

**In Vitro* Study to Compare the Ability of Two Toothgel Formulations to Visually Occlude Dentine Tubules Over Seven Days of Treatment.62-LAB-SEM-24-002 _Intertek (Nov'24 - Dic'24)

Estudio clínico con 31 pacientes:

- Reducción de la sensibilidad dental desde la primera aplicación (-51,6%).
- Reducción del 96,8% a las 2 semanas (p<0,001).



PASTA DENTÍFRICA
GEL DENTÍFRICO:

- Monofluorofosfato sódico 1,89%
- Nitrato potásico 5%
- Agente mineral obliterante 9%
- Xilitol 1%
- Ion fluoruro 2500 ppm

Pasta

8 470002 083554

Gel

8 470001 749840



C.N. Pasta dentífrica 208355.4
C.N. Gel dentífrico 174984.0



C.N. 174982.6

GEL BIOADHESIVO:

- Monofluorofosfato sódico 1,89%
- Nitrato potásico 10%
- Agente mineral obliterante 7,5%
- Ion fluoruro 2500 ppm

8 470001 749826

COLUTORIO:

- Nitrato potásico 5%
- Fluoruro sódico 0,31%
- Cymenol 0,1%
- Xilitol 1%
- Copolímero PVM/MA. Agente oclusivo de los túbulos dentinarios
- Ion fluoruro 1400 ppm



8 430340 051967

C.N. 167098.4

Referencias: 1. De Jesús Calderón MV, et al. Efectividad de los polialcoholes en la prevención de la caries dental: una revisión sistemática. Revista Venezolana de Investigación Odontológica. 2019;7:6-35. **2.** Evaluation of the efficacy of a product for oral care in use test under dentist control (Data on file 2024). **3.** Frechoso SC, et al. Evaluation of the efficacy of two potassium nitrate bioadhesive gels (5% and 10%) in the treatment of dentine hypersensitivity. A randomised clinical trial. J Clin Periodontol. 2003;30:315-20. 4. Hodosh M, et al. A new, noninvasive approach for successfully treating the pain and inflammation of TMJ disorders. J Oral Implantol. 2007;33:365-70. **5.** In Vitro Study to Compare the Ability of Two Toothpaste Formulations to Visually Occlude Dentine Tubules Over Fifteen Successive Days of Treatment (Data on file). **6.** Mäkinen KK. Sugar alcohols, caries incidence, and remineralization of caries lesions: a literature review. Int J Dent. 2010;2010:981072. **7.** Mira Otal FJ, et al. Eficacia de un gel bioadhesivo dental con dióxido de silicio obliterante, nitrato potásico y monofluorofosfato sódico en pacientes con hiperestesia dentinaria. Científica dental: Revista científica de formación continuada. 2016;13:33-40. **8.** Mira Otal FJ, et al. Eficacia de un dentífrico con dióxido de silicio obliterante en pacientes con hiperestesia dentinaria. Rev Cubana Estomatol. 2017;54:1-12. **9.** Mira J, et al. Estudio de prueba de concepto sobre la eficacia de una pasta dental y un colutorio para hacer frente simultáneamente a gingivitis e hiperestesia dental. RCOE: Revista del Ilustre Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España. 2022;27:235-42. **10.** Molina, GF, et al. Nanotecnología en Odontología: Aspectos generales y posibles aplicaciones. Methodo Investigación Aplicada a las Ciencias Biológicas. 2018;3:59-66. **11.** Moslemi N, et al. Comparison of desensitizing efficacy of an Iranian dentifrice and a commercially available dentifrice: a randomized double-blinded controlled clinical trial. J Dent (Tehran). 2013;10:351-7. **12.** Park YD, et al. Clinical Study on Effects of Dentifrice Containing 0.05% Isopropyl Methylphenol (IPMP) and 0.05% Dipotassium Glycyrrhizinate (GK2) on Gingival Conditions. Korean Academy of Preventive Dentistry. 2010;55-61. **13.** Payne D, et al. A randomised clinical trial to assess control of oral malodour by a novel dentifrice containing 0.1%w/w o-cymen-5-ol, 0.6%w/w zinc chloride. Int Dent J. 2011;61 Suppl 3:60-6. **14.** Pizzey RL, et al. Antimicrobial effects of o-cymen-5-ol and zinc, alone & in combination in simple solutions and toothpaste formulations. Int Dent J. 2011;61 Suppl 3:33-40. **15.** Purra AR, et al. A comparative evaluation of propolis and 5.0% potassium nitrate as a dentine desensitizer: A clinical study. J Indian Soc Periodontol. 2014;18:466-71. **16.** Rahardjo A, et al. Efficacy of a toothpaste containing 5% potassium nitrate in desensitizing dentin hypersensitivity. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 2016;9:345-7. **17.** Sano H, et al. Effect of a xylitol and fluoride containing toothpaste on the remineralization of human enamel in vitro. J Oral Sci. 2007;49:67-73. 18. Ten Cate JM, et al. Fluoride Mode of Action: Once There Was an Observant Dentist… J Dent Res. 2019;98:725-30. **18.** In-Vitro Study 1.1 62-LAB-SMH-24-001 Fluoride. Intertek (May'24- Jun'24). **19.** In vitro study comparing the ability of four mouthwash formulations versus controls to repair and protect bovine enamel lesions over 5 days of pH cycling. Intertek (Oct 24'- Nov'24). **20.** Ensayo in vivo para la evaluación de la eficacia de un colutorio para la reducción de la hipersensibilidad dentinaria. (N=20. Data on file, Julio 2024.) **21.** In Vitro Study to Compare the Ability of Two Toothpaste Formulations to Visually Occlude Dentine Tubules Over Fifteen Successive Days of Treatment. 62-LAB-SEM-24-001. Intertek (Jun 24' - Ag'24). **22.** Evaluación de la eficacia y tolerabilidad de SensiLacer gel bioadhesivo para el cuidado bucal en sujetos con dientes sensibles bajo control odontológico (N=31. Data on file, Junio 2024.) **23.** In Vitro Study to Compare the Ability of Two Toothgel Formulations to Visually Occlude Dentine Tubules Over Seven Days of Treatment.62-LAB-SEM-24-002. Intertek (Nov'24 - Dic'24)

PN/SE-LIT0525