VADEMÉCUM

Lacer Personal Health

ÍNDICE

SALUD BUCODENTAL

Lacer Anticaries 4
LacerFresh 6
Lacer Natur 8
LacerBlanc 10
LacerBlanc White Flash 12
GingiLacer 14
SensiLacer 16
Lacer Oros 18
Lacer Junior & Infantil 20
Flúor Lacer 22
OrtoLacer 24
Clorhexidina Lacer 26
Lacer Mucorepair 28
XeroLacer 30
Lacer pro 32
AftaLacer 34

HIGIENE BUCAL MECÁNICA

Lacer cepillos dentales 36
Lacer cepillos cabezal pequeño 38
Lacer cepillos dentales Mini 40
Lacer Hidro 42
Lacer Interdentales 44
Lacer Picks 46
Lacer Sedas dentales 48

CUIDADO Y TRATAMIENTO DEL CABELLO

Gamas Pilexil Anticaída 50
Pilexil Anticaída 52
Pilexil Anticaída Forte Max 56
Pilexil Anticaspa & Uso Frecuente 58

CIRCULACIÓN PERIFÉRICA

Thrombocid 60

ANTIHEMORROIDALES

Anso 62
Ansollitas 63

MENOPAUSIA

Flavia 64

ANTIPRURIGINOSOS

Talquistina talco, crema y loción 66
Talquistina Crema Hidratante 67
Talquistina PostPica 68
Talquistina Tattoo 69

CUIDADO POST-SOLAR

Balsoderm post-solar 70

ANTIHISTAMÍNICOS

Virlix Plus 71

FICHAS TÉCNICAS 72

Lacer®

Eficacia Multiprotección

La pasta dentífrica y el colutorio **Lacer** están indicados para prevenir la caries y mantener la boca sana a diario.

La pasta dentífrica **Lacer** gracias a su completa formulación ayuda mantener la boca sana y protegida:

- Acción Anticaries
- Acción Antiplaca
- Acción Antimicrobiana
- Protege dientes y encías
- 5 veces más remineralizante
- 24 horas protección antiplaca
- 98% eliminación bacterias cariogénicas

PASTA DENTÍFRICA LACER

Lacer Pasta Dentífrica es una fórmula innovadora de acción multiprotección de dientes y encías para mantener la boca sana a diario. Gracias a su alto contenido en Flúor de liberación inmediata y su completa formulación con Cymenol, ayuda a mantener una boca sana y protegida.

Su completa composición proporciona acción protectora de dientes y encías con acción antiplaca, anticaries, 5 veces más remineralizante y una acción antimicrobiana con alta capacidad de penetración en el biofilm oral que previene la formación de placa bacteriana y ayuda a prevenir la inflamación de las encías. Una fórmula completa para el cuidado de la boca.

Sin peligro de intolerancias. Indicada para para adultos y niños mayores de 12 años.

TAMBIÉN TEXTURA EN GEL

Gel dentífrico de textura fluida. Una textura para aquellas personas que prefieren un dentífrico fluido, en gel, conservando la eficaz formulación anticaries y la alta calidad de **Laboratorios Lacer**.

COLUTORIO

Lacer Colutorio previene la aparición de placa bacteriana y limpia en profundidad. Previene la caries dental, refuerza el esmalte dental, fortalece los dientes, combate el mal aliento y protege eficazmente dientes y encías, dejando una agradable sensación de limpieza. Cymenol como agente antimicrobiano previene la inflamación de las encías.

La composición de Lacer Colutorio tiene poder antioxidante que reduce los radicales libres y favorece la salud gingival.

Fórmula completa

- **Anticaries · Antiplaca**
- **Protege las encías**
- **Combate el mal aliento**
- **Antimicrobiano**
- **Antioxidante**
- **Remineralizante**



PRODUCTOS SIN GLUTEN

NUEVO

Composición, presentaciones y código nacional

PASTA DENTÍFRICA
Aqua, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Hydrated Silica, Glycerin, Magnesium Aluminum Silicate, PEG-8, Aroma, Xylitol, Sodium Lauryl Sulfate, Xanthan Gum, Sodium Fluoride, CI77891, Sodium Citrate, Sodium Gluconate; Sodium Saccharin, O-Cymen-5-ol, Citric Acid, Menthol, Limonene.

GEL DENTÍFRICO
Aqua, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Hydrated Silica, Glycerin, PEG-8, Sodium Monofluorophosphate, Xylitol, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Xanthan Gum, Urea, Sodium Hydroxide, Sucralose, Menthol, Sodium Gluconate, Methyl Salicylate, Vanillin, Limonene.

COLUTORIO
Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Xylitol, Hydroxyacetophenone, Sodium Citrate, Sodium Gluconate, Poloxamer 407, Aroma, O-Cymen-5-ol, Sodium Fluoride, Menthol, Sucralose, Citric Acid, Mentha Piperita Oil, Neohesperidin Dihydrochalcone, Vanillin, CI 14720, Limonene.

Pasta Dentífrica 125 ml
C.N. 391847.3
8 470003 918473

Pasta Dentífrica 75 ml
C.N. 391854.1
8 470003 918541

Colutorio 200 ml
C.N. 201368.1
8 470002 013681

Colutorio 500 ml
C.N. 205765.4
8 470002 057654

Pasta Dentífrica 200 ml
C.N. 163647.8
8 470001 636478

Pack Viaje 3 Pastas
C.N. 165113.6
8 470001 651136

Colutorio 1.000 ml
C.N. 162085.9
8 430340 050724

Colutorio 100 ml
C.N. 161122.2
8 470001 611222

Gel Dentífrico 125 ml
C.N. 174866.9
8 470001 748669

Pasta Dentífrica 50 ml
C.N. 391862.6
8 470003 918626

Lacer® Fresh

Siente el frescor en tu boca

Lacer Fresh Frescor Prolongado es una gama anticaries de uso diario idónea para mantener una boca sana y conseguir un aliento fresco.

Gracias a su fórmula avanzada, previene la aparición de caries y placa dental, protege el esmalte y las encías y enmascara el mal aliento, proporcionando una agradable e intensa sensación de frescor en la boca de efecto prolongado.

SALES DE FLÚOR

- **ACCIÓN ANTICARIES**
  + PROTECCIÓN DEL ESMALTE

Previene la caries dental, con capacidad protectora del esmalte dental frente al ácido.

CLORHIDRATO DE OCTENIDINA Y CLORURO DE ZINC

- **ACCIÓN ANTIPLACA Y PROTECCIÓN DE LAS ENCÍAS**

Previene la formación de placa dental y protege eficazmente dientes y encías, ayudando a mantener una buena salud bucodental.

- **ENMASCARA EL MAL ALIENTO**

Gracias a sus ingredientes activos, la fórmula **Lacer Fresh Frescor Prolongado** enmascara el mal aliento. Las sales de Zinc tienen la capacidad de combinarse con los compuestos volátiles, impidiendo que sean perceptibles al olfato.

MENTHA PIPERITA, EUCALIPTOL Y MENTOL

- **FRESCOR PROLONGADO**

Contiene aromas potenciadores del efecto frescor prolongado. Sabor a menta fresca persistente en boca que combina el frescor de la *Mentha piperita*, la intensidad duradera del mentol, y la persistencia en boca del eucaliptol.

PRODUCTOS SIN GLUTEN



- Agradable e intensa sensación de frescor prolongado
- Antiplaca y anticaries
- Protege las encías
- Aliento fresco

Composición, presentaciones y código nacional

GEL DENTÍFRICO
Diclorhidrato de Octenidina, Cloruro de Zinc, Monofluorofosfato Sódico (1.400ppm).

COLUTORIO
Diclorhidrato de Octenidina, Cloruro de Zinc, Fluoruro Sódico (225ppm).

SPRAY
Diclorhidrato de Octenidina, Cloruro de Zinc, Fluoruro Sódico (225ppm).

Gel Dentífrico 75 ml	Gel Dentífrico 125 ml	Colutorio 500 ml	Spray 15 ml
C.N. 217604.1	C.N. 168332.8	C.N. 342970.2	C.N. 184010.3
8 470002 176041	8 470001 683328	8 470003 429702	8 470001 840103

Lacer Natur

A base de ingredientes de origen natural

Lacer Natur ha sido desarrollado teniendo en cuenta la salud de tu boca, y también el cuidado del medio ambiente. Por eso estamos comprometidos con la protección del planeta y trabajamos cada día para que los envases sean más sostenibles, con materiales reciclados y reciclables.

Lacer Natur, con extractos naturales vegetales, protege contra la caries, previene la placa dental y ayuda a mantener una boca y unos dientes sanos.

Además **Lacer Natur** ofrece una higiene dental óptima sin dañar el esmalte, ni irritar encías y mucosas.

BIOSECUR® ORGANIC ORAL CARE

Extractos de cítricos que aportan bioflavonoides y polifenoles. Con propiedades antisépticas y antioxidantes.

FLÚOR

Previene la caries, remineraliza los dientes y combate la placa dental.

XILITOL

Se extrae de fuentes naturales y sostenibles como madera de abedul o haya. Previene la placa dental y protege contra la caries.

- **A base de ingredientes de origen natural**
- **Envases más sostenibles**
- **Ayuda a mantener una boca sana**
- **Protege contra la caries**
- **Previene la placa dental y protege el esmalte dental**

A BASE DE INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL



ENJUAGUE BUCAL DIARIO
Botella de plástico 100% reciclado.
Envase 100% reciclable.

PASTA DENTÍFRICA
Estuche papel FSC 100% reciclado.

CEPILLO
Mango natural de Bambú, antibacteriano y biodegradable.
Filamentos ECO de origen vegetal.
Estuche papel 100% reciclado.

PRODUCTOS SIN GLUTEN

Composición, presentaciones y código nacional

PASTA DENTÍFRICA
Aqua, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Dicalcium Phosphate Dihydrate, Glycerin, Hydrated Silica, Sodium Monofluorophosphate, Xylitol, Xanthan Gum, Aroma, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Phytate, Stevia Rebaudiana Leaf Extract, Citrus Aurantium Amara Fruit Extract, Citrus Reticulata Fruit Extract, Citrus Aurantium Sinensis Peel Extract, Ascorbic Acid, Citric Acid, Lactic Acid, Citral, Linalool.

COLUTORIO
Aqua, Xylitol, Methylpropanediol, Glycerin, Glycolipids, Sodium Citrate, Sodium Phytate, Sodium Benzoate, Mentha Spicata Herb Oil (Hierbabuena), Citric Acid, Citrus Aurantium Amara Fruit Extract, Citrus Reticulata Fruit Extract, Citrus Aurantium Sinensis Peel Extract, Ascorbic Acid, Lactic Acid, Limonene.

Lacer Natur
Pasta Dental 100 ml
C.N. 189473.1
8 470001 894731

Lacer Natur
Enjuague bucal 500 ml
C.N. 194484.9
8 470001 944849

Lacer Natur
Cepillo
C.N. 195317.9
8 470001 953179

Lacer® Blanc

Acción blanqueadora intensa protegiendo dientes y encías

EL EQUILIBRIO PERFECTO

Acción Blanqueadora Intensa

Las Sílicas de la nueva formulación de **LacerBlanc** arrastran eficazmente las manchas extrínsecas, devolviendo a los dientes su color natural, brillo y suavidad, sin dañar el esmalte dental.

Además, gracias a la Polivinilpirrolidona o PVP, crea una capa protectora o película que recubre los dientes, evitando la adhesión de nuevas manchas y ayudando a eliminar las ya existentes.

• BLANQUEAMIENTO *Blue optic*

LacerBlanc incorpora en su nueva pasta dentífrica el colorante azul **"Blue brilliant"** que proporciona a los dientes una apariencia más blanca con efecto inmediato* tras el cepillado dental.

Protección de dientes y encías

• PROTEGE LOS DIENTES
Anticaries · Antiplaca · Antisarro

El Ion Fluoruro (1.400 ppm) de la nueva composición de **LacerBlanc** fortalece el esmalte dental y previene la caries, la combinación de Cymenol y Zinc previene la formación de placa bacteriana y la acción combinada del Zinc y el Hexametafosfato sódico ayuda a eliminar y previene la formación de sarro.

• PROTEGE Y TONIFICA LAS ENCÍAS

El Cymenol es un potente agente antimicrobiano con una alta capacidad de penetración en el biofilm oral (placa bacteriana), disgregándolo y ejerciendo su actividad antimicrobiana desde las capas más profundas, contribuyendo a la salud gingival. A su vez, la Vitamina E ayuda a tonificar las encías y a mantenerlas en buen estado y su combinación con el Cymenol confiere un efecto antioxidante en la cavidad oral.

• PREVIENE LA SENSIBILIDAD DENTAL

La sal de potasio ayuda a controlar la sensibilidad dental causada por la exposición de la dentina a alimentos o bebidas frías, calientes, ácidas o dulces u otros estímulos externos.



- **Blanquea los dientes a diario sin dañar el esmalte dental**
- **92% de eficacia blanqueadora**
- **Limpieza y abrasividad en perfecto equilibrio**

**El efecto es temporal. Efecto óptico: "An In-Vitro Study to Compare the Non-Abrasive Whitening Efficacy of Six Toothpaste Formulations". Intertek (Nov'23)*

Composición, presentaciones y código nacional

PASTA DENTÍFRICA Sabor Menta
Hexametafosfato Sódico, Polivinilpirrolidona, Monofluorofosfato Sódico, Xilitol, Citrato Potásico, Citrato de Zinc, Vitamina E Acetato, Cymenol.

PASTA DENTÍFRICA Sabor Citrus
Hexametafosfato Sódico, Polivinilpirrolidona, Monofluorofosfato Sódico, Xilitol, Citrato Potásico, Citrato de Zinc, Vitamina C Fosfato Sódico, Ion Fluoruro.

COLUTORIOS
Hexametafosfato Sódico, Polivinilpirrolidona, Cloruro de Zinc, Ion Fluoruro.

Nuevo
Pasta Dentífrica sabor menta 75 ml
C.N. 169171.2
8 470001 691712

Nuevo
Pasta Dentífrica sabor menta 125 ml
C.N. 169172.9
8 470001 691729

Nuevo
Pasta Dentífrica sabor citrus 75 ml
C.N. 157654.5
8 470001 576545

Nuevo
Pasta Dentífrica sabor citrus 125 ml
C.N. 157655.2
8 470001 576552

Colutorio sabor menta 500 ml
C.N. 169170.5
8 470001 691705

Colutorio sabor citrus 500 ml
C.N. 163947.9
8 470001 639479

Lacer Blanc WHITE FLASH

Blanqueamiento dental inmediato

LACER BLANC WHITE FLASH KIT DENTAL BLANQUEADOR

LacerBlanc White Flash es un kit de blanqueamiento dental, activado por luz, de fácil uso y de efecto inmediato tras la primera aplicación.

CLÍNICAMENTE TESTADO

NUEVA TECNOLOGÍA

LacerBlanc White Flash está desarrollado por una nueva tecnología compuesta por:

- Férula dental fotoluminiscente que se impregna de **partículas fotoluminiscentes** que aceleran el proceso de descomposición del activo blanqueador y que se carga con luz natural o artificial durante **5 minutos.**
- **Gel dental preparador** que prepara y acondiciona el diente para favorecer el activo blanqueador.
- **Un gel dental blanqueador** que contiene el activo blanqueador: el percarbonato sódico que se descompone en peróxido de hidrógeno (<0,1%), siendo realmente efectivo ya que está en contacto con el diente durante 15 minutos en condiciones óptimas.



- Kit de blanqueamiento dental clínicamente testado
- Blanqueamiento en solo una semana
- Cómodo, de fácil uso y de efecto inmediato tras 15 minutos de aplicación en el diente
- Activo blanqueador: Percarbonato sódico (se descompone en Peróxido de hidrógeno <0,1%)
- Contenido: 10 usos

Presentación y código nacional

LacerBlanc White Flash
C.N. 193248.8

8 470001 932488

Gingi Lacer®

*Reduce el sangrado gingival en menos de 48 horas**

GingiLacer está desarrollado para prevenir y eliminar la aparición del biofilm o placa dental, aliviar la sintomatología de la enfermedad periodontal en sus fases iniciales, restableciendo al mismo tiempo el buen estado de los tejidos gingivales.

GingiLacer cuenta con una formula avanzada basada en un triple sistema de acción:

SISTEMA ANTIPLACA-ANTISÉPTICO

- Efecto antiplaca debido a la acción antiséptica del Cymenol y su alta capacidad de penetrar en el biofilm, reforzado por la presencia de sales de zinc.
- Previene y reduce el sangrado de encías debido a la acción astringente de las sales de zinc.

SISTEMA ANTI-INFLAMACIÓN DE LAS ENCÍAS

Protege y tonifica las encías, reduciendo su inflamación y mejorando su estado debido a la acción del glicirrizato potásico.

SISTEMA ANTICARIES

Acción remineralizante debido a la acción de las sales de flúor.

GingiLacer es un dentífrico que genera una limpieza suave y eficaz debido a que contiene tensioactivos o espumantes suaves, con un óptimo poder de limpieza y arrastre para realizar la correcta limpieza dental diaria.

Además, **GingiLacer** tiene un agradable sabor a menta. Puede utilizarse de forma continuada como higiene habitual, ya que no irrita las encías ni modifica el color de los dientes.

PRODUCTOS SIN GLUTEN



- **Reducción del sangrado gingival en menos de 48 horas**
- **Previene la inflamación y enrojecimiento de las encías**
- **Alta eficacia antiplaca de la combinación Cymenol/Zinc**
- **Sin tinción, adecuado para uso diario**
- **Tratamiento idóneo para pacientes diabéticos**

* *Eficacia frente al sangrado gingival de una pasta dental con O-Cymen-5-ol. Mira J., Denche M., Vivancos F.*

Composición, presentaciones y código nacional

PASTA DENTÍFRICA

Cymenol	0,1%
Cloruro de Zinc	0,6%
Glicirrizato Potásico	0,2%
Monofluorofosfato Sódico	1,061%
Ion Fluoruro	1.400 ppm

Bajo índice de abrasividad.

COLUTORIO

Cymenol	0,1%
Cloruro de Zinc	0,1%
Glicirrizato Potásico	0,05%
Fluoruro Sódico	0,05%
Ion Fluoruro	225 ppm

Pasta Dentífrica 75 ml
C.N. 257337.6
8 470002 573376

Pasta Dentífrica 125 ml
C.N. 267872.9
8 470002 678729

Pasta Dentífrica 200 ml
C.N. 182826.2
8 470001 828262

Colutorio 200 ml
C.N. 263657.6
8 470002 636576

Colutorio 500 ml
C.N. 263665.1
8 430340 050748

Colutorio 1.000 ml
C.N. 163308.8
8 470001 633088

Sensi Lacer®

Alivio rápido de la sensibilidad dental

SensiLacer reduce la sensibilidad dental de forma rápida y duradera, protegiendo y fortaleciendo la dentina, lo cual potencia su acción desensibilizante.

• Nitrato potásico: uno de los principios activos más eficaces para disminuir la sensibilidad dental.
• Flúor: su acción remineralizadora potencia el efecto desensibilizante, contribuyendo a la prevención de la sensibilidad dental y protegiendo contra la caries.

• Agente mineral obliterante o PVM/MA: ejerce una obliteración rápida y duradera de la superficie dentinal y sus túbulos, reforzando la dentina, efecto que refuerza su eficacia, protegiendo al diente frente a los estímulos causantes de la sensibilidad dental

SensiLacer Gel Bioadhesivo: Clínicamente se ha demostrado que con la primera aplicación de **SensiLacer Gel Bioadhesivo** hay una reducción del 47% de la sensación dolorosa y, al cabo de una semana, una reducción del 94% de la misma.

SensiLacer Pasta Dentífrica y SensiLacer Gel Dentífrico: dentífricos de acción desensibilizante rápida y prolongada, que disminuyen la sensibilidad de los dientes sensibles frente al frío, calor, dulces u otros estímulos. Por su bajo índice de abrasividad, estos dentífricos son idóneos para el cuidado de los dientes sensibles y como dentífricos de uso diario para personas propensas a presentar sensibilidad dental.

PRODUCTOS SIN GLUTEN

- **Reduce la sensibilidad dental de forma rápida y duradera**
- **Oclusión de los túbulos dentinarios**
- **Reducción del impulso nervioso**
- **Acción remineralizante del esmalte**



NUEVO

Composición, presentaciones y código nacional

PASTA DENTÍFRICA

Nitrato Potásico	5%
Agente Mineral Obliterante	9%
Monofluorofosfato Sódico	1,89%
Xilitol	1%
Ion Fluoruro	2.500 ppm

GEL BIOADHESIVO

Nitrato Potásico	10%
Agente Mineral Obliterante	7,5%
Monofluorofosfato Sódico	1,89%
Ion Fluoruro	2.500 ppm

GEL DENTÍFRICO

Nitrato Potásico	5%
Agente Mineral Obliterante	9%
Monofluorofosfato Sódico	1,89%
Xilitol	1%
Ion Fluoruro	2.500 ppm

COLUTORIO

Nitrato Potásico	5%
Fluoruro Sódico	0,31%
Xilitol	1%
Ion Fluoruro	1.400 ppm

Copolímero PVM/MA Agente oclusivo de los túbulos dentinarios

Gel Dentífrico 75 ml
C.N.: 174983.3
8 470001 749833

Gel Dentífrico 125 ml
C.N.: 174984.0
8 470001 749840

Gel Bioadhesivo 50 ml
C.N.: 174982.6
8 470001 749826

Colutorio 500 ml
C.N. 167098.4
8 470001 670984

Pasta Dentífrica 75 ml
C.N. 206359.4
8 470002 063594

Pasta Dentífrica 125 ml
C.N. 208355.4
8 470002 083554

Lacer® Oros

Protege tu boca con la mejor protección bucodental integral

Lacer Oros Acción Integral está desarrollado para una protección bucodental integral de dientes y encías, al tener una triple acción anticaries, prevenir el sangrado gingival y desensibilizante dental.

FÓRMULA AVANZADA

Desarrollada para proteger la salud de dientes y encías:

- Alta capacidad de penetración en el biofilm bucodental.
- Ayuda a reducir bacterias patógenas manteniendo viabilidad de microbiota sana propia (estudio clínico interno).

LIMPIEZA SUAVE Y EFICAZ

Dentífrico con espumantes suaves y con óptimo poder de limpieza y arrastre para realizar la correcta limpieza dental diaria.

SISTEMA ANTIPLACA-ANTISÉPTICO

Lacer Oros Acción Integral gracias a la combinación de sus ingredientes activos presenta un potente mecanismo de acción antibiofilm, tanto en penetración como eliminación, que le proporciona unas interesantes propiedades antisépticas y antioxidantes avaladas clínicamente en su uso diario.

Este sistema muestra una eficacia significativa en los principales parámetros gingivales y un potente efecto astringente que ayuda a reducir el sangrado gingival.

SISTEMA ANTIINFLAMACIÓN

Lacer Oros Acción Integral contiene ingredientes activos que ayudan a proteger y tonificar las encías. Así mismo presenta unas interesantes propiedades antinflamatorias y antioxidantes.

SISTEMA ANTICARIES

Debida a la acción de las sales de flúor con un conocido efecto remineralizante del esmalte dental.

ALIVIO SENSIBILIDAD DENTAL

La presencia de sales de potasio genera un eficaz alivio del dolor causado por la hipersensibilidad dentinaria debido al bloqueo del estímulo doloroso neural.

PRODUCTOS SIN GLUTEN



- **Previene el sangrado de encías**
- **Reduce la sensibilidad dental**
- **Protege contra la caries**

Composición, presentaciones y código nacional

PASTA DENTÍFRICA

Cymenol	0,1%
Cloruro de Zinc	0,6%
Monofluorofosfato Sódico	1,895%
Glicirrizato Potásico	0,2%
Nitrato Potásico	5%
Ion Fluoruro	2.500 ppm

COLUTORIO

Cymenol	0,1%
Cloruro de Zinc	0,1%
Fluoruro Sódico	0,2%
Glicirrizato Potásico	0,05%
Nitrato Potásico	1%
Ion fluoruro	900 ppm

Pasta Dentífrica 75 ml
C.N. 396556.9
8 470003 965569

Pasta Dentífrica 125 ml
C.N. 309443.6
8 470003 094436

Colutorio 500 ml
C.N. 260083.6
8 430340 052926

Colutorio 1.000 ml
C.N. 195096.3
8 470001 950963

Pasta Dentífrica 200 ml
C.N. 192931.0
8 470001 929310

Gel dental Lacer® júnior & infantil

Cuidado de la salud bucodental de los más jóvenes

Lacer se renueva en el cuidado de la salud bucodental infantil. Actualizamos y modernizamos todas las fórmulas, haciéndolas más eficaces y sostenibles para el medio ambiente.

El **Gel dental Lacer Infantil previene la caries** de forma eficaz desde la aparición del primer diente, con 1.000ppm de ion fluoruro, la dosis adecuada para prevenir la caries en niños y niñas de 6 meses a 6 años, siguiendo la recomendación de la SEOP y la IAPD. Agradable sabor a fresa.

El **Gel dental Lacer Júnior previene la caries** de forma eficaz, gracias a sus 1.400ppm de ion fluoruro y **protege las encías** de los niños y niñas a partir de 6 años, gracias al Pantenol, que refuerza la protección de las encías. Dos agradables sabores: fresa y menta.

Ambos **GELES remineralizan el esmalte dental** gracias a la combinación de Flúor + Calcio, actuando como un **escudo protector en el diente y ofreciendo una mayor protección frente a la caries** dental en toda la gama.

Están formulados:

- Sin GLUTEN
- Sin LACTOSA
- Sin CONSERVANTES
- Con EDULCORANTES no CARIOGÉNICOS

El **Cepillo dental Lacer Infantil** ha sido especialmente diseñado para niños de 2 a 6 años de edad, tanto por sus dimensiones como por su cabezal pequeño y cerdas suaves que al combinarlo con el **Gel dental Lacer Infantil**, le garantiza al niño una correcta higiene bucal adecuada a esta franja de edad.

El **Cepillo dental Lacer Júnior** ha sido diseñado, tanto por sus dimensiones como por su forma y cabezal, con el objetivo de garantizar la correcta higiene bucal de niños mayores de 6 años.

Se recomienda el cepillado dental tres veces al día, después de cada comida y sobre todo por la noche, antes de acostarse.







- **Flúor + calcio: Mayor protección anticaries**
- **Dosis adecuada de flúor para cada franja de edad**
- **Gama Junior: Con Pantenol para reforzar la protección de las encías**
- **Excelente sabor a fresa y menta**
- **No contiene conservantes**
- **Bajo índice de abrasividad**

PRODUCTOS SIN GLUTEN

Composición, presentaciones y código nacional

GEL DENTÍFRICO LACER JÚNIOR
Monofluorofosfato sódico, Glicerofosfato cálcico, Xilitol, Pantenol, Ion fluoruro (1.400 ppm)

GEL DENTÍFRICO LACER INFANTIL
Monofluorofosfato sódico, Glicerofosfato cálcico, Xilitol, Ion fluoruro (1.000 ppm)

Lacer Júnior fresa Gel Dentífrico 75 ml
C.N. 331978.2
8 470003 319782

Lacer Júnior menta Gel Dentífrico 75 ml
C.N. 155588.5
8 470001 555885

Gel Infantil 75 ml
C.N. 184562.7
8 470001 845627

Cepillo Dental Lacer Infantil
C.N. 162597.7
8 470001 625977

Cepillo Dental Lacer Júnior con ventosa
C.N. 266651.1
8 470002 666511

Cepillo Dental Lacer Júnior
C.N. 338574.9
8 470003 385749

FLÚOR Lacer® júnior

Cuidado de la salud bucodental de los más jóvenes

- Dosis de flúor adecuada para uso diario (225ppm) y para uso semanal (900ppm).
- La combinación del flúor + calcio, actúa como escudo protector en el diente, ayudando a mantener en buen estado el esmalte dental.
- Con Pantenol, que protege las encías.
- Con Xilitol, edulcorante no cariogénico que mejora la acción anticaries.
- Sin Gluten y sin Alcohol.



PRODUCTOS SIN GLUTEN

Flúor Lacer Júnior se renueva en el cuidado de la salud bucodental infantil con nuevas fórmulas mejoradas, nuevas indicaciones y nuevos diseños en toda la gama.

Flúor Lacer Júnior es un enjuague bucal, de uso diario o semanal, que **previene la caries** de forma eficaz y **protege las encías de los más jóvenes.**

- **Flúor + calcio: Mayor protección anticaries**
- **Refuerza la protección de las encías gracias al Pantenol**
- **Excelente sabor a fresa y menta**

Composición, presentaciones y código nacional

COLUTORIO DIARIO
Monofluorofosfato Sódico, Glicerofosfato cálcico, Xilitol, Pantenol, Excipientes c.s.

Ion Fluoruro: 225 ppm

Enjuague bucal uso diario sabor fresa 500 ml
C.N. 238576.4
8 470002 385764

Enjuague bucal uso diario sabor menta 500 ml
C.N. 212209.3
8 470002 122093

COLUTORIO SEMANAL
Monofluorofosfato Sódico, Glicerofosfato cálcico, Xilitol, Pantenol, Excipientes c.s.

Ion Fluoruro: 900 ppm

Enjuague bucal uso diario sabor fresa 100 ml
C.N. 238592.4
8 470002 385924

Orto Lacer®

Cuidado y protección de los dientes y encías en portadores de aparatos de ortodoncia

OrtoLacer es una gama de productos especialmente indicada para cuidar y proteger los dientes y encías en personas portadoras de cualquier tipo de aparato de ortodoncia. La gama está compuesta por gel dentífrico, colutorio con un único y agradable sabor a lima fresca y cera de ortodoncia.

ORTOLACER GEL Y COLUTORIO

La nueva formulación de **OrtoLacer** gel y colutorio, de uso diario, está basada en un **triple sistema de protección** frente a la caries, la desmineralización y la inflamación de las encías provocada por el uso de aparatos de ortodoncia.

TRIPLE SISTEMA

1. Sistema antiplaca

Gracias a la eficacia del Cymenol:
- Produce un efecto antiplaca bacteriana debido a su función antiséptica.
- Tiene un alta capacidad "selectiva" de penetración en el biofilm oral.
- Tiene un efecto antioxidante en la mucosa oral
- Es respetuoso con ecosistemas acuáticos.

2. Sistema anticaries

Gracias a la eficacia del Ion Fluoruro y al Glicerofosfato de Calcio*:
- Actúa contra la caries gracias a las Sales de Flúor.
- Fortalece el esmalte dental gracias a las Sales de Flúor y al Calcio.

3. Sistema protector de mucosas y encías

Gracias a la eficacia del Glicirrizato Potasico:
- Protege y tonifica las mucosas orales y encías.
- Tiene una actividad sinérgica con el Cymenol.

ORTOLACER CERA DE ORTODONCIA

La cera de ortodoncia **OrtoLacer** aplicada sobre el bracket ayuda a aliviar y prevenir las rozaduras e irritaciones causadas por los aparatos de ortodoncia en la mucosa oral, encías y lengua.

** OrtoLacer Gel Ortodoncia.*



- **Nueva fórmula avanzada**
- **Protege dientes y encías**
- **Agradable sabor a lima fresca con textura fluida en gel**

Composición, presentaciones y código nacional

GEL DENTÍFRICO

Cymenol	0,1%
Glicirrizato Potásico	0,05%
Glicerofosfato de calcio	0,25%
Ion Fluoruro	1.400 ppm

COLUTORIO

Cymenol	0,1%
Glicirrizato Potásico	0,05%
Ion Fluoruro	225 ppm

Gel Dentífrico lima fresca 75 ml
C.N. 164502.9
8 470001 645029

Gel Dentífrico lima fresca 125 ml
C.N. 195670.5
8 470001 956705

Colutorio lima fresca 500 ml
C.N. 164503.6
8 470001 645036

Colutorio lima fresca 1.000 ml
C.N. 189510.3
8 470001 895103

Cera de Ortodoncia (7 barras)
C.N. 163945.5
8 470001 639455

Cera de Ortodoncia (14 barras)
C.N. 177007.3
8 470001 770073

Clorhexidina Lacer®

El antiséptico de elección con sabor agradable

Clorhexidina Lacer es un eficaz antiséptico de amplio espectro frente a los microorganismos de la placa bacteriana y con sabor agradable. Su acción es rápida y mantiene su efecto durante un largo período de tiempo, evitando la posible recolonización bacteriana de la cavidad oral. La **Clorhexidina Lacer** se une fuertemente a diversas superficies bucodentales formando así un sistema de liberación sostenida.

La **Clorhexidina Lacer** actúa a distintos niveles: elimina la estructura de la placa bacteriana existente, inhibe la adhesión de proteínas muco-salivares, inhibe la formación de nueva placa bacteriana y destruye los microorganismos responsables de la formación de la placa dental.

Está indicado como coadyuvante en el tratamiento de gingivitis y periodontitis. También es eficaz como terapia de mantenimiento en el tratamiento periodontal y preimplantario, en cirugía periodontal (pre y post operatorio), en implantología, en profilaxis dental de pacientes irradiados (caries rampante) y en gerodontología.

La nueva fórmula de **colutorio Clorhexidina Lacer 0,12%** incorpora un excipiente mucoadhesivo que prolonga su permanencia en boca, lo que junto con la presencia del Cymenol, incrementa su eficacia antimicrobiana.

El **gel bioadhesivo Clorhexidina Lacer** incorpora Cymenol en su formulación. Esta combinación penetra mejor en el biofilm incrementando su actividad antiséptica local. Además presenta una bioadhesividad mejorada que facilita la aplicación y adherencia del producto en la zona a tratar. Este efecto se mantiene de forma prolongada y sostenida lo que potencia el efecto antimicrobiano del producto.



- **La Clorhexidina es un eficaz antiséptico de amplio espectro frente a los microorganismos de la placa bacteriana**
- **Sabor agradable que favorece el cumplimiento del tratamiento completo por parte del paciente**

Composición, presentaciones y código nacional

PASTA DENTÍFRICA

Digluconato de Clorhexidina	0,12%
Xilitol	1%
Vitamina E Acetato	0,5%
Provitamina B5 (Pantenol)	0,5%

COLUTORIO 0,12%

Digluconato de Clorhexidina	0,12%
Cymenol	0,1%
Xilitol	1%

COLUTORIO 0,2%

Digluconato de Clorhexidina	0,2%
Xilitol	1%

GEL BIOADHESIVO

Digluconato de Clorhexidina	0,2%
Cymenol	0,1%

SPRAY 0,12%

Digluconato de Clorhexidina	0,12%
Cymenol	0,1%
Xilitol	1%

SPRAY 0,2%

Digluconato de Clorhexidina	0,2%
Xilitol	1%

Pasta Dentífrica 75 ml
C.N. 189308.6
8 470001 893086

Gel Bioadhesivo 50 ml
C.N. 354605.8
8 470003 546058

Spray 0,12% 30 ml
C.N. 247742.1
8 430340 061942

Spray 0,2% 30 ml
C.N. 216547.2
8 470002 165472

Colutorio 0,20% 500 ml
C.N. 198288.9
8 470001 982889

Colutorio 0,12% 200 ml
C.N. 385641.6
8 470003 856416

Colutorio 0,12% 500 ml
C.N. 385666.9
8 430340 059963

Lacer® MUCOREPAIR

*Facilita la cicatrización de las mucosas orales potenciada por su capacidad antimicrobiana**

La gama completa **Lacer Mucorepair** restablece la salud de las mucosas orales, favoreciendo la cicatrización y ayudando a reducir la inflamación potenciado por su capacidad antimicrobiana*.

Lacer Mucorepair tiene la composición idónea para ayudar en la regeneración de los tejidos orales, ayudando a reducir la inflamación y favoreciendo la cicatrización de los tejidos orales (periodontales y mucosas) potenciado por su capacidad antimicrobiana, acelerando así la recuperación de la mucosa oral dañada tras:

- Implantes
- Biopsias
- Post cirugía odontológica
- Lesiones de la mucosa oral causadas por traumatismos.
- Rozaduras provocadas por aparatos de ortodoncia y prótesis dentales.

COLUTORIO

Lacer Mucorepair Colutorio está desarrollado para ayudar en la regeneración y favorecer la cicatrización de los tejidos orales (periodontales y mucosas) tras sufrir una agresión que afecta a una gran superficie por cirugía oral o rozaduras provocadas por aparatos de ortodoncia y prótesis dentales.

GEL TÓPICO

Lacer Mucorepair Colutorio forma una película alrededor del área dañada, protegiéndola del medio externo y ayudando en su conjunto a la correcta y rápida recuperación de la mucosa oral dañada.



- **Restablece la salud de las mucosas orales, favoreciendo la cicatrización y ayudando a reducir la inflamación**
- **Indicado en extracciones generales quirúrgicas, implantes, biopsias y cualquier post cirugía odontológica**

** Para aplicar en tejidos orales tras cirugía o molestias causadas por aparatos y prótesis dentales.*

Composición, presentaciones y código nacional

GEL TÓPICO	
Asiaticósido	0,%
Ácido Hialurónico	0,2%
Hialuronato Sódico	0,1%
Enoxolona	0,2%
Cymenol	0,1%

COLUTORIO	
Asiaticósido	0,05%
Ácido Hialurónico	0,11%
Hialuronato Sódico	0,1%
Enoxolona	0,057%
Cymenol	0,1%

Lacer Mucorepair Colutorio 200 ml
C.N. 218572.2
8 470002 185722

Lacer Mucorepair Gel Tópico 30 ml
C.N. 184834.5
8 470001 848345

Xero Lacer®

¿Boca seca? Alivio inmediato de la sequedad oral

XeroLacer está especialmente desarrollado para el cuidado de la boca seca (Xerostomía). Su completa formulación calma la sensación de sequedad oral, refresca la boca, remineraliza el esmalte y refuerza las encías, previniendo la aparición de alteraciones bucodentales ocasionadas por la disminución de saliva.

EQUILIBRANTE SALIVAL

Los componentes activos de la fórmula actúan como un regulador salival que compensa el déficit de sales minerales que contiene la saliva y estimula la secreción de la misma, favoreciendo el equilibrio del flujo salival.

PROTEGE FRENTE A LAS CARIES Y REMINERALIZA EL ESMALTE

El aporte de Flúor refuerza el esmalte dental y proporciona una eficaz prevención de la caries dental. Su formulación cuenta con ingredientes que potencian la acción cariostática (anticaries) y remineralizadora del esmalte.

PREVIENE LA INFLAMACIÓN Y EL SANGRADO GINGIVAL

La eficaz acción antimicrobiana del Cymenol reduce la formación de placa dental de forma prolongada y disminuye la inflamación de los tejidos gingivales, previniendo la aparición de gingivitis y sangrado gingival. Contiene vitaminas que facilitan la regeneración epitelial del tejido gingival y protegen las encías frente a la agresión de la placa dental. Además, contiene Aloe vera, cuya acción sinérgica de enzimas, aminoácidos, minerales y vitaminas restablece la mucosa gingival, y Glicirrizato potásico que previene la irritación.

NEUTRALIZA EL MAL ALIENTO Y EL MAL SABOR DE BOCA

Reequilibra la flora bacteriana con lo que se recupera la eficaz protección de la saliva frente a las bacterias causantes de mal aliento y mal sabor de boca. Además, **XeroLacer Colutorio** está formulado sin alcohol y con un excipiente muy suave, adecuado incluso para el uso diario de personas con una mucosa oral muy delicada.

XeroLacer Gel Tópico está indicado para reforzar la acción de hidratación bucal y prolongarla en el tiempo.

PRODUCTOS SIN GLUTEN



- **Equilibrante salival**
- **Protege frente a las caries, remineraliza el esmalte**
- **Previene el sangrado y la inflamación gingival**
- **Neutraliza el mal aliento y el mal sabor de boca**

Composición, presentaciones y código nacional

PASTA DENTÍFRICA

Cymenol	0,1%
Glicirrizato Potásico	0,15%
Monofluorofosfato Sódico	0,8%
Fluoruro Sódico	0,32%
Vitamina E Acetato	0,2%
Excipiente para Xerostomia a base de sales minerales, con vitamina y Aloe Vera	
Ion Fluoruro	2.500 ppm

Pasta Dentífrica 75 ml
C.N. 355834.1
8 470003 558341

Pasta Dentífrica 125 ml
C.N. 356345.1
8 470003 563451

COLUTORIO

Cymenol	0,1%
Fluoruro Sódico	0,1%
Monofluorofosfato Sódico	0,72%
Glicirrizato Potásico	0,05%
Vitamina E Acetato	0,2%
Excipiente para Xerostomia a base de sales minerales, con vitamina y Aloe Vera	
Ion Fluoruro	1.400 ppm

Colutorio 500 ml
C.N. 373100.3
8 430340 053640

GEL TÓPICO

Cymenol	0,1%
Fluoruro Sódico	0,064%
Monofluorofosfato Sódico	0,16%
Glicirrizato Potásico	0,1%
Vitamina E Acetato	0,2%
Excipiente para Xerostomia a base de sales minerales, con vitaminas y Aloe Vera	
Ion Fluoruro	500 ppm

Gel Tópico 50 ml
C.N. 150614.6
8 470001 506146

SPRAY

Cymenol	0,1%
Fluoruro Sódico	0,1%
Monofluorofosfato Sódico	0,72%
Glicirrizato Potásico	0,05%
Vitamina E Acetato	0,2%
Excipiente para Xerostomia a base de sales minerales, con vitaminas y Aloe Vera	
Ion Fluoruro	1.400 ppm

Spray 30 ml
C.N. 372706.8
8 470003 727068

Lacer pro

Fijación y limpieza de prótesis dentales removibles

LacerPro Forte Crema Adhesiva

24 HORAS DE FIJACIÓN SEGURA Y CONFORTABLE*

LacerPro Forte es una crema adhesiva que proporciona una fijación rápida y segura de las dentaduras postizas.

Su fórmula permite una fijación segura y confortable durante todo el día*.

Una vez aplicada la crema, y colocada la dentadura, ésta reacciona con la saliva, creando un cojín entre la prótesis y las encías, previniendo así la aparición de irritaciones en las encías.

LacerPro Forte permite la ingesta de cualquier comida o bebida. No altera el sabor de los alimentos. Crea una capa protectora que evita la entrada de alimentos entre la dentadura y la encía.

** Hasta 24 horas de fijación en dentaduras superiores.*

LacerPro Forte proporciona una fijación segura y confortable durante 24 horas* después de su aplicación.

LacerPro Forte forma un cojín entre la dentadura postiza y las encías, dando una gran sensación de confort y evitando la entrada de alimentos.

Ventajas:

- Sin zinc.
- Fácil aplicación.
- Fuerte fijación.

LacerPro Limpiadores

LIMPIEZA EN SÓLO 3 MINUTOS CON OXÍGENO ACTIVO

En tan sólo 3 minutos, el oxígeno activo generado limpia de forma intensa la prótesis dental, llegando incluso a aquellas zonas más difíciles de limpiar.

Otras importantes acciones de **LacerPro Limpiadores** son:

- Elimina las manchas de café, té y tabaco.
- Elimina los residuos de alimentos, previniendo la aparición de irritaciones en las encías.
- Previene la formación de sarro.
- Elimina el mal aliento ocasionado por los residuos acumulados en la prótesis.
- Deja una agradable sensación de frescor.

La gama más completa para prótesis dentales removibles



Presentaciones y código nacional

LacerPro Limpiadores 64 u.	LacerPro Limpiadores 32 u.	LacerPro Forte Crema Fijadora 40 g	LacerPro Forte Crema Fijadora 70 g
C.N. 163591.4	C.N. 153533.7	C.N. 183747.9	C.N. 183748.6
8 470001 635914	8 470001 535337	8 470001 837479	8 470001 837486

Afta Lacer®

Alivio del dolor por aftas y llagas bucales

AftaLacer forma una película protectora que aísla la zona, alivia el dolor y favorece el proceso de curación y cicatrización.

Su acción se basa en la combinación de polivinil-pirrolidona (PVP) con el complejo Zinc-Taurina.

Esta combinación ayuda a reducir la irritación típica de las aftas y acelera el proceso de cicatrización:

- Crea una cobertura protectora sobre la lesión.
- Evita que las terminaciones nerviosas entren en contacto con el exterior y provoquen dolor al ingerir alimentos o bebidas.
- Lubrica e hidrata el tejido oral, favoreciendo su regeneración.
- Larga permanencia de recubrimiento en la lesión.
- Favorece la curación de las lesiones orales.
- Reduce la inflamación de la mucosa oral.

AftaLacer Colutorio: Lesiones muy extendidas en la mucosa oral como aftas herpetiformes, lesiones por brackets y úlceras por prótesis dentales.



PRODUCTOS SIN GLUTEN

- **Alivia el dolor y ayuda a la curación de aftas, llagas aftosas, irritaciones, lesiones por brackets, úlceras por prótesis dentales y otras lesiones de la cavidad oral**
- **Utilización segura en niños**
- **Eficacia demostrada**
- **Sin alcohol**

Presentación y código nacional

AftaLacer
Colutorio 120 ml
C.N. 163185.5

8 470001 631855

Lacer®
Cepillos dentales

Para un cepillado dental exigente y responsable

Los filamentos de alta calidad de los **nuevos cepillos dentales Lacer** garantizan el correcto arrastre de la placa dental, protegiendo dientes y encías.

AMPLIA GAMA PARA CADA NECESIDAD

Es importante escoger el cepillo dental que más se ajuste a las necesidades de higiene bucal de cada persona. Por eso **Lacer** dispone de una amplia variedad de cepillos tanto para uso diario como para usos específicos:

• CEPILLO DENTAL LACER FUERTE
Para personas que buscan una mayor sensación en el cepillado y no sufren o padecen sensibilidad dental ni problemas de encías.
FILAMENTOS DE 0,009" de diámetro.

• CEPILLO DENTAL LACER MEDIO
Para una completa higiene bucal diaria.
FILAMENTOS DE 0,008" de diámetro.

• CEPILLO DENTAL LACER SUAVE
Para una higiene bucal diaria en casos de dientes y encías sensibles.
FILAMENTOS EXTERNOS DE 0,006" de diámetro.
FILAMENTOS INTERNOS DE 0,007" de diámetro.

• CEPILLO DENTAL LACER EXTRASUAVE
Para una higiene bucal en casos de hiperestesia dental (sensibilidad dental) y/o con encías muy delicadas.
FILAMENTOS EXTERNOS DE 0,005" de diámetro.
FILAMENTOS INTERNOS DE 0,004" de diámetro.

• CEPILLO DENTAL LACERBLANC
El cepillo **LacerBlanc** está especialmente diseñado para una higiene bucal que favorece la eliminación de las manchas dentales extrínsecas.
FILAMENTOS EMBOSSED TYNEX.

• CEPILLO DENTAL QUIRÚRGICO
Cepillo dental con filamentos extremadamente suaves para la higiene bucal tras haber sufrido una intervención quirúrgica en la cavidad bucal.
FILAMENTOS DE 0,003" de diámetro.

• CEPILLO DENTAL ORTODONCIA
Para una higiene bucal diaria en portadores de ortodoncia. Su corte en forma de "V" permite un completo arrastre de la placa dental a la vez que limpia eficazmente los restos de alimentos depositados en los brackets, bandas y alambres.
FILAMENTOS EXTERNOS DE 0,007" de diámetro.
FILAMENTOS INTERNOS DE 0,008" de diámetro.

• CEPILLO DENTAL GINGILACER
El cepillo **GingiLacer** está especialmente diseñado para una limpieza muy suave y completa. Arrastra la placa dental y limpia eficazmente el espacio interdental y subgingival, cuidando las encías.
Sus filamentos PBT microfinos y flexibles arrastran la placa dental y limpian el espacio interdental y subgingival, cuidan las encías y previenen su irritación..
MONOFILAMENTOS PBT.

• LIMPIADOR LINGUAL LACER
En la lengua se depositan la mayoría de bacterias que causan el mal olor. Es muy importante limpiarla diariamente para poder completar al higiente bucal y ayudar a tener un buen aliento.





- **Filamentos de alta calidad que garantizan el correcto arrastre de la placa dental, protegiendo dientes y encías**
- **Cabezal que facilita el cepillado en las zonas de difícil acceso**
- **Capuchón protector para evitar contaminación externa**
- **Diseño más sostenible: Capùchón 100% reciclable y estuche de cartón reciclado**
- **Más colores de cepillos en toda la gama**

Presentaciones y código nacional

Cepillo Dental Fuerte C.N. 162834.3 8 470001 628343	Cepillo Dental Medio C.N. 162974.6 8 470001 629746	Cepillo Dental Suave C.N. 162982.1 8 470001 629821	Cepillo Dental Extrasuave C.N. 162990.6 8 470001 629906
Cepillo Dental LacerBlanc C.N. 153937.3 8 470001 539373	Cepillo Dental Quirúrgico C.N. 163006.3 8 470001 630063	Cepillo Dental Ortodoncia C.N. 333583.6 8 470003 335836	Cepillo Dental GingiLacer C.N. 164407.7 8 470001 644077
Cepillo Dental de Viaje C.N. 164799.3 8 470001 647993	Limpiador Lingual Lacer C.N. 184839.0 8 470001 848390		

Lacer®

Cepillos dentales
CABEZAL PEQUEÑO

Una pequeña gran idea

El cabezal pequeño desarrollado por **Laboratorios Lacer** consigue una mayor precisión en la limpieza dental, llegando con comodidad a zonas de difícil acceso.

Además, su innovador diseño en forma de punta de diamante facilita un cepillado cómodo y eficaz, y su forma redondeada evita rozaduras y previene posibles lesiones en las encías y la mucosa oral.

Está especialmente indicado para ayudar a:

- **Mayor precisión en la limpieza bucal**
- **Limpieza en las zonas posteriores de la boca**
- **Limpieza de arcadas dentarias pequeñas o con limitación de apertura bucal**
- **Limpieza en personas con malposición dental**
- **Limpieza de las piezas en proceso de erupción**
- **Niños que pasan de un cepillo Junior a uno de adulto**

DISPONIBLE EN 2 MODELOS

• CEPILLO DENTAL CABEZAL PEQUEÑO LACER MEDIO

Con **Filamentos Tynex** que arrastran eficazmente la placa dental, cuidando dientes y encías gracias a sus puntas pulidas y redondeadas.

• CEPILLO DENTAL CABEZAL PEQUEÑO GINGILACER

Con **Filamentos PBT** microfinos y flexibles, que eliminan la placa dental del espacio interdental y supragingival, cuida las encías y previene su inflamación.





MÁXIMA PRECISIÓN

Presentaciones y código nacional

Cepillo Dental Medio
C.N. 168558.2

8 470001 685582

Cepillo Dental GingiLacer
C.N. 168560.5

8 470001 685605

Lacer®

Cepillos dentales MINI colors

El color que va contigo

Cepillos que siguen la premisa de **Lacer** de ofrecer las mejores prestaciones y la máxima calidad, ahora también con una amplia variedad de colores diferentes con los filamentos del mismo color que el mango.

- **FILAMENTOS**

Con puntas pulidas y redondeadas con extremos texturizados que ayudan a proteger dientes y encías.

- **CABEZAL**

De tamaño reducido y en forma de diamante que permite la limpieza en zonas de difícil acceso.

- **MANGO**

De tamaño reducido que facilita llevarlo en cualquier lugar.

DISPONIBLE EN DOS MODELOS

- Modelo MEDIO con filamentos de 0,008” de diámetro
- Modelo SUAVE con filamentos de 0,006” de diámetro



6 colores

Presentaciones y código nacional

Cepillo Dental Lacer MINI Medio (6 colores)
C.N. 183819.3
8 470001 838193

Cepillo Dental Lacer MINI Suave (6 colores)
C.N. 183818.6
8 470001 838186

Lacer Hidro®
Irrigador bucal

La nueva generación de irrigadores bucales

Los irrigadores bucales **Lacer Hidro Advanced** y **Lacer Hidro Inalámbrico Portátil** son el complemento perfecto a un buen cepillado dental. Sus impulsos de agua a presión favorecen la limpieza en profundidad en las zonas de difícil acceso y la zona subgingival, ayudando a reducir el biofilm dental.



LACER HIDRO IRRIGADOR BUCAL ADVANCED

La eficacia del irrigador bucal **Lacer Hidro Advanced** permite una completa limpieza dental e interdental en el hogar. Sus 10 niveles de presión crean una experiencia personalizada; sus configuraciones más bajas son perfectas para la limpieza de bolsas periodontales y las más altas para una limpieza interdental de alta potencia.

• DEPÓSITO DE AGUA DE 600 ml
Para una limpieza prolongada y completa de toda la boca.

• 10 NIVELES DE PRESIÓN Y 2 MODOS DE USO

• 4 RECAMBIOS INCLUÍDOS
Indicado para bolsas periodontales, zonas furcales.

• LIMPIADOR LINGUAL
Irrigador normal, Cepillo de Ortodoncia, Limpiador lingual, Limpiador subgingival.



COLORES DISPONIBLES:

LACER HIDRO IRRIGADOR BUCAL INALÁMBRICO PORTÁTIL

Gracias a su diseño ergonómico, su tamaño reducido de fácil transporte y su facilidad de llenado y manejo, el irrigador bucal **Lacer Hidro Inalámbrico Portátil** facilita una limpieza interdental más fácil, eficaz y rápida que el hilo dental.

• 4 MODOS DE LIMPIEZA
Normal, suave, masajeador de encías y personalizable.

• 7 NIVELES DE PRESIÓN

• DEPÓSITO DE AGUA DESMONTABLE DE 200 ml
Para facilitar su llenado y limpieza.

• 2 RECAMBIOS INCLUÍDOS

• DISEÑO ERGONÓMICO, LIGERO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR

• TAMAÑO COMPACTO
Ocupa el mínimo espacio posibe en el baño.



- **Máximo nivel de higiene bucal**
- **Especialmente indicado para aparatos de ortodoncia, implantes, puentes, coronas, bolsas periodontales y fundas**

Presentaciones y código nacional

Lacer Hidro Irrigador Bucal Advanced (Blanco/Negro)	Lacer Hidro Irrigador Bucal Inalámbrico Portátil	Pack Recambio Lacer Hidro
C.N. 167891.1	C.N. 212620.6	C.N. 212622.0
8 470002 126190	8 470002 126206	8 470002 126220

Lacer® Interdentales

Porque todos los espacios son importantes

La gama **Lacer Cepillos Interdentales** ha sido especialmente diseñada para aportar una higiene eficaz de los espacios interdentales. Permiten eliminar la placa bacteriana en los espacios interdentales y en los espacios de difícil acceso, previniendo la aparición de caries, protegiendo las encías y evitando problemas periodontales, manteniendo unas encías sanas.

- **Mango bimaterial más ergonómico y antideslizante**
- **Un cepillo interdental para cada necesidad**
- **Alambre de acero quirúrgico recubierto de poliuretano**
- **Capuchón protector para cada cepillo**
- **5 medidas diferentes**
- **2 modelos: Lacer Interdental Recto y Lacer Interdental Angular**

Proporciona la higiene más completa de todos los espacios interdentales, aparatos de ortodoncia, prótesis fijas implantosoportadas, zonas furcales y diastemas.

UN TAMAÑO ADECUADO PARA CADA NECESIDAD

La gama **Lacer Cepillos Interdentales** facilita el acceso y la limpieza de cualquier ángulo y espacio interdental y zonas especiales.

ULTRAFINO	EXTRAFINO SUAVE	EXTRAFINO	FINO	CÓNICO
Espacios extremadamente estrechos	Espacios muy estrechos y muy sensibles	Espacios muy estrechos	Espacios estrechos	Espacios medianos y grandes
Ø prensado: **0,45 mm**	Ø prensado: **0,5 mm**	Ø prensado: **0,6 mm**	Ø prensado: **0,7 mm**	Ø prensado: **0,8 mm**

RECTO



LACER INTERDENTAL RECTO

Cepillo interdental de mango bimaterial y antideslizante recto. Fácil sujeción, lo que permite una mejor guía y manejo del cepillo. Cuello flexible y orientable para facilitar su utilización. El mango del cepillo es muy flexible para permitir el acceso incluso a los espacios intermolares.

ANGULAR



LACER INTERDENTAL ANGULAR

Cepillo interdental cuyo mango angulado permite un giro de hasta 90º. Al ser un mango más largo, permite un cómodo agarre para llegar a las piezas más distales.

Presentaciones y código nacional

Recto Ultrafino 6u.
C.N. 159268.2
8 470001 592682

Recto Extrafino Suave 6u.
C.N. 150530.9
8 470001 505309

Recto Extrafino 6u.
C.N. 150527.9
8 470001 505279

Recto Fino 6u.
C.N. 150528.6
8 470001 505286

Recto Cónico 6u.
C.N. 150529.3
8 470001 505293

Angular Ultrafino 6u.
C.N. 159270.5
8 470001 592705

Angular Extrafino Suave 6u.
C.N. 150526.2
8 470001 505262

Angular Extrafino 6u.
C.N. 150522.4
8 470001 505224

Angular Fino 6u.
C.N. 150523.1
8 470001 505231

Angular Cónico 6u.
C.N. 150525.5
8 470001 505255

Lacer® Picks Interdental

Palillos interdentales suaves y flexibles

Lacer Picks Interdental son unos palillos interdentales acabados en una punta de goma diseñados para la limpieza e higiene de los espacios interdentales.

Punta suave y flexible. Su forma se adapta a la mayoría de los espacios interdentales y proporciona una gran capacidad de limpieza de los restos de alimentos y placa bacteriana. No contiene partes metálicas por lo que no provoca efecto galvánico.

Mango ergonómico, largo y curvado para tener un mejor acceso a la mayoría de los espacios interdentales. Su recubrimiento de goma flexible, suave y antideslizante lo hace más fácil de usar.



Incluye un estuche de bolsillo para llevarlos de forma higiénica a todas partes y utilizarlos cuando sea necesario.





- **Acabados en punta de goma suave y flexible**
- **Mango ergonómico largo y curvado**
- **Sin partes metálicas**

Presentación y código nacional

Lacer Picks Interdentales
30 unidades
C.N. 190333.4

8 470001 903334

Lacer®
Sedas Dentales

Porque todos los espacios son importantes

LACER SEDA DENTAL

GRAN ARRASTRE

- Seda trenzada con cera para permitir acceder a espacios estrechos.
- Fibra multifilamento para incrementar la capacidad de arrastre.
- Con flúor.
- 50 metros.

MÁXIMA HIGIENE

Especialmente indicada en espacios estrechos, mal posicionamiento dental, etc, que requiere de un arrastre mayor, prevención de patologías por acúmulo de placa, y cuidado de boca sana.

LACER CINTA DENTAL (PTFE) Y LACER HILO DENTAL (PTFE)

Con Fibra PTFE
(Fibra Sintética de Politetrafluoretileno)

- Facilitar el deslizamiento incluso en aquellos espacios muy estrechos e irregulares.
- Alta capacidad de arrastre.
- Fibra monofilamento de gran resistencia, no se deshilacha.
- Con flúor. Sabor a menta.
- 50 metros.

LACER CINTA DENTAL

DELICADA CON LAS ENCÍAS

Cinta muy fina que se desliza en todos los espacios y con gran superficie de arrastre.

LACER HILO DENTAL

PARA LOS ESPACIOS MÁS ESTRECHOS

Hilo muy fino para permitir entrar en todos los espacios.

GINGILACER CINTA DENTAL

CON CERA

La nueva **Cinta Dental GingiLacer** está compuesta por filamentos de polietileno, trenzados de tal forma que generan una cinta muy suave, fina, resistente y elástica.

La gran capacidad de limpieza y suavidad de esta cinta, hace que sea idónea para la higiene de los espacios interdentales de encías delicadas o especialmente sensibles.

Las fibras de **GingiLacer Cinta Dental** arrastran eficazmente la placa dental, principal causante de gingivitis, inflamación y sangrado de encías.



Una seda dental para cada tipo de espacio interdental

Presentaciones y código nacional

Lacer Hilo Dental 50 m	GingiLacer Cinta Dental 50 m	Lacer Seda Dental 50 m	Lacer Cinta Dental 50 m
C.N. 214692.1	C.N. 172019.1	C.N. 336933.6	C.N. 213066.1
8 470002 146921	8 470001 720191	8 470003 369336	8 470002 130661

Pilexil®
ANTICAÍDA

CIENCIA CAPILAR ANTICAÍDA PARA CADA ETAPA

Lacer

CAÍDA PUNTUAL / OCASIONAL

NORMAL

Pilexil®
ANTICAÍDA



Pilexil Cápsulas

Pilexil Ampollas

- **Pilexil Ampollas:** Apto en periodos de lactancia*

- Cambios estacionales.
- Estrés.
- Agentes externos (radiación UV).
- Déficit de nutrientes, vitaminas o minerales.
- Agentes químicos (tintes, queratina...).

+18 años

INTENSA

¡NUEVO!

Pilexil®
ANTICAÍDA ForteMAX

¡NUEVO FORMATO BEBIBLE!



Pilexil Forte Max Spray

Pilexil Forte Max Ampollas

Pilexil Forte Max Cápsulas

Pilexil Forte Max Bebible

+18 años

CAÍDA PROGRESIVA Y CRÓNICA

¡NUEVO!

Pilexil®
ANTICAÍDA ForteMAX

¡NUEVO FORMATO BEBIBLE!



Pilexil Forte Max Spray

Pilexil Forte Max Ampollas

Pilexil Forte Max Cápsulas

Pilexil Forte Max Bebible

- Alopecia androgenética hereditaria.
- Menopausia.
- Etapa madura del cabello.

+45 años

+18 años



Pilexil Acondicionador

Pilexil Champú

Pilexil®
ANTICAÍDA

TRATAMIENTO ÚNICO Y COMPLEMENTARIO
a todo tipo de caídas.

Se recomienda realizar cada uno de los tratamientos un mínimo de 3 meses para obtener los mejores resultados.
Sin efectos secundarios · Para hombre y mujer

**Pilexil Ampollas Anticaída es recomendado en periodos de lactancia, no obstante, se debe consultar a su especialista antes de su uso.*

Pilexil® ANTICAÍDA

Tratamiento único y complementario a todo tipo de caídas.

PILEXIL CHAMPÚ ANTICAÍDA

Indicado para frenar la caída del cabello.

Uso frecuente.

Fórmula innovadora a base de Serenoa Serrulata, Zinc PCA y vitaminas específicas para el cabello.

Nutre y repara.

Incorpora acondicionadores especiales que aportan todas las propiedades de un champú de belleza.

PILEXIL ACONDICIONADOR ANTICAÍDA

Indicado para acondicionar el cabello, a la vez que frena la caída, lo fortalece y lo desenreda.

Uso frecuente.

Formulado a base de Serenoa Serrulata, Zinc PCA y vitaminas específicas para el cabello.

- **Eficacia demostrada**
- **Indicado tanto para hombre como para mujer**
- **Excelente tolerancia**

www.pilexil.com

El pelo tiene su ciencia.



Presentaciones y código nacional

Pilexil Acondicionador Anticaída 200 ml	Pilexil Champú Anticaída 300 ml	Pilexil Champú Anticaída 500 ml	Pilexil Champú Anticaída 900 ml
C.N. 208832.0	C.N. 206375.4	C.N. 154418.6	C.N. 184837.6
8 470002 088320	8 470002 063754	8 470001 544186	8 470001 848376

Pilexil®
ANTICAÍDA

Tratamiento completo para frenar la caída del cabello ocasional.

PILEXIL AMPOLLAS

Actúa sobre los factores que intervienen en la caída del cabello.

Fórmula innovadora a base de Serenoa Serrulata, Zinc PCA, Tocoferil Nicotinato y vitaminas como: Biotina, Pantenol, Piridoxina y Vitamina E.

Via tópica.

Apto en periodos de lactancia*

PILEXIL CÁPSULAS

Aporta las vitaminas y nutrientes más idóneos para la integridad del pelo y de su principal constituyente.

Vía Oral.

Fórmula con alto contenido de L-Cistina (500 mg), Hierro, Zinc y 9 vitaminas.

Sin gluten.

El pelo tiene su ciencia.



www.pilexil.com

- **Indicado para hombres y mujeres en cambios estacionales y/o con estrés, agentes químicos (tintes, queratina,...) y déficit de nutrientes, vitaminas o minerales**
- **Eficacia demostrada**
- **Indicado tanto para hombre como para mujer**
- **Excelente tolerancia**

**Pilexil Ampollas Anticaída es recomendado en periodos de lactancia, no obstante, se debe consultar a su especialista antes de su uso.*

Presentaciones y código nacional

Pilexil Cápsulas 50 cápsulas	Pilexil Cápsulas 100 cápsulas	Pilexil Cápsulas 150 cápsulas	Pilexil Ampollas Anticaída 15 x 5 ml
C.N. 392720.8	C.N. 151552.0	C.N. 162083.5	C.N. 208496.4
8 470003 927208	8 470001 515520	8 470001 620835	8 470002 084964

Pilexil®
ANTICAÍDA ForteMAX

Tratamiento completo para frenar la caída progresiva o puntual intensa del cabello.

Pilexil Anticaída Forte MAX es un tratamiento eficaz para frenar la caída progresiva del cabello. Su fórmula innnovadora mutifactorial actúa a través de 4 complejos:

- Complejo antioxidante
- Complejo nutricional
- Complejo revitalizante
- Complejo 5 alfa

SPRAY Y AMPOLLAS

Pilexil Forte Max Spray Anticaída y **Pilexil Forte Max Ampollas Anticaída** son un tratamiento eficaz para frenar la caída del cabello reforzando el anclaje del folículo, normalizando el crecimiento capilar y mejorando el aporte de nutrientes para formar un cabello sano y fuerte.

Gracias al Acetato de tocoferol y la Niacina, evitan la formación de radicales libres que dañan el cabello y lo debilitan, haciendo que el cabello continúe con su ciclo normal de crecimiento.

** Biotina, Selenio y Zinc: contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones normales.*
** Zinc: contribuye al mantenimiento de las uñas en condiciones normales.*

Su nueva fórmula innnovadora nutre la fibra capilar desde la raíz favoreciendo la microcirculación del cuero cabelludo y promueve un crecimiento saludable del cabello.

Gracias a la acción de la *Serenoa serrulata* y *Humulus lupulus*, **Pilexil Anticaída Forte MAX** promueve el anclaje de la fibra capilar al cuero cabelludo, a través de un potente complejo que evita la caída del cabello.

CÁPSULAS Y BEBIBLE

Pilexil Forte Max Cápsulas Anticaída y el nuevo formato **Pilexil Forte Max Bebible Anticaída** son un tratamiento para la caída progresiva del cabello*, y para las uñas** mejorando el aporte de nutrientes a tu organismo.

Las nuevas fórmulas de los complementos alimenticios de **Pilexil Anticaída Forte MAX** contienen Riboflavina, Vitamina E, Zinc y Selenio que contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo.

También contienen Biotina, Selenio y Zinc que contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones normales, además de Niacina, Ácido pantoténico, Riboflavina, Vitamina B12 y Vitamina B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

La fórmula está reforzada por *Serenoa repens*, *Cucurbita pepo*, *Humulus lupulus* y Niacina.



Lacer

El pelo tiene su ciencia.
Nueva fórmula innovadora multifactorial.



- **Indicado para mujeres y hombres con alopecia androgenética (AGA), menopausia y/o etapa madura del cabello, cambios estacionales, estrés, agentes externos (radiacion UV), deficit de nutrientes, vitaminas o minerales y agentes químicos (tintes, queratina...)**
- **Gama completa (spray, ampollas, cápsulas y nuevo formato bebible)**
- **Eficacia demostrada**
- **Excelente tolerancia**

Presentaciones y código nacional

Pilexil Forte Max Spray 120 ml	Pilexil Forte Max Ampollas 20 u. x 5 ml	Pilexil Forte Max Cápsulas 60 u.	Pilexil Forte Max Bebible 30 u.
C.N. 216678.3	C.N. 216677.6	C.N. 215888.7	C.N. 215891.7
8 470002 166783	8 470002 166776	8 470002 158887	8 470002 158917

Pilexil®
ANTICASPA

Un cabello bonito libre de caspa

www.pilexil.com

- **Fórmulas innovadoras y sin efecto rebote**
- **Eficacia demostrada**

Presentaciones y código nacional

Pilexil Champú Caspa Seca 300 ml
C.N. 168333.5

8 470001 683335

Pilexil Champú Caspa Grasa 300 ml
C.N. 168337.3

8 470001 683373

PILEXIL CHAMPÚ CASPA SECA

Indicado para el tratamiento de la caspa seca.

Su completa formulación regula la descamación y destruye las membranas celulares del Malassezia (microorganismo característico de la caspa). También elimina el picor del cuero cabelludo.

Formulada a base de Terpineol + Extracto de Sauce, Ac. Salicílico y Climbazol.

PILEXIL CHAMPÚ CASPA GRASA

Indicado para el tratamiento de la caspa grasa.

Su completa formulación ofrece efecto frente a los agentes que causan la caspa como Malassezia, regula el exceso del sebo, disminuye la descamación del cuero cabelludo y elimina el picor.

Formulada a base de Terpineol + Extracto de Sauce, Ac. Salicílico, Climbazol y Lipoaminoácido seborregulador.



Pilexil®
USO FRECUENTE

Un cabello suave e hidratado cada día

www.pilexil.com

Formulado con principios activos suaves y eficaces para el lavado diario y/o frecuente del cabello, para el cuidado y lavado de cabellos delicados y para alternar con cualquiera de los champús de tratamiento.

Pilexil Uso Frecuente está formulado a base de:

Pantenol: mejora la humectación del cabello, su maleabilidad y le da un aspecto más saludable. De esta forma el cabello queda hidratado, recuperando así sus condiciones naturales.

La Miel: producto natural elaborado por las abejas con propiedades hidratantes sobre el cuero cabelludo y cabello. Además, sus componentes promueven la queratinización y descamación normal del cuero cabelludo.

- **Especial para el lavado diario y/o frecuente del cabello**
- **Adecuado para cabellos delicados y para alternar con champús de tratamiento**



Presentación y código nacional

Pilexil Champú Uso Frecuente 300 ml
C.N. 168335.9

8 470001 683359

Thrombocid®

Mejora el flujo sanguíneo

Thrombocid está indicado en:

- Alivio eficaz de la pesadez y tirantez en piernas con varices, en adultos, desde la primera aplicación.
- Alivio de hematomas superficiales producidos por golpes, en adultos y niños mayores de 1 año.



- **Ahora Thrombocid Forte también en 100 g**
- **PRINCIPIO ACTIVO**
  Pentosano Polisulfato sódico
- **THROMBOCID FORTE**
  5 veces más concentración

- **Con Pentosano Polisulfato Sódico**
- **Alivio desde la primera aplicación**

Presentaciones y código nacional

Thrombocid 1 mg/g 30 g	Thrombocid 1 mg/g 60 g	Thrombocid Forte 5 mg/g 60 g	Thrombocid Forte 5 mg/g 100 g
C.N. 696989.2	C.N. 696971.7	C.N. 843987.4	C.N. 726431.6
8 470006 969892	8 470006 969717	8 470008 439874	8 470007 264316

anso

Deja las hemorroides atrás con Anso

Anso está indicado para el tratamiento local de las afecciones hemorroidales internas y externas.

TRIPLE ACCIÓN

- Acción analgésica: Lidocaína clorhidrato (anestésico).
- Acción antiinflamatoria: Triamcinolona acetónido (corticoide).
- Acción antitrombótica: Pentosano Polisulfato sódico.



Presentación y código nacional

Anso 50 g
C.N. 709162.2

8 470007 091622

ansollitas

Higiene anal sin dolor

Ansollitas permite una limpieza suave y eficaz. Ayuda al alivio de la irritación y el escozor.

AYUDA AL ALIVIO DE LA IRRITACIÓN

- Aloe Vera: Hidrata la piel.
- Canadian Willowherb: Calmante.

PERMITE UNA LIMPIEZA SUAVE Y EFICAZ

- Celulosa con fibra de origen vegetal.
- 100% natural.

AYUDA AL ALIVIO DEL ESCOZOR

- Castaño de indias: Favorece la microcirculación del área anal.
- Centella asiática: Favorece el proceso natural de cicatrización.



- **Toallitas húmedas para la higiene diaria de la zona de hemorroides externas**
- **Biodegradable**

Presentación y código nacional

Ansollitas
50 unidades
C.N. 156256.2

8 470001 562562

Flavia

Para una menopausia confortable

Flavia Nocta, Flavia Plus y **el nuevo Flavia Libital** son complementos alimenticios que ayudan a aliviar los signos molestos de la menopausia:

- Sudoración / Sofocos
- Conciliación del sueño
- Irritabilidad
- Cansansio / Fatiga
- Mantenimiento de los huesos
- Libido

FLAVIA PLUS

Gracias a su ingredientes, **Flavia Plus** actúa sobre los signos de la menopausia en mujeres sin problemas de sueño o en tratamiento con un producto para conciliarlo.

- Las Isoflavonas de soja son hormonas vegetales con una estructura muy parecida a las hormonas femeninas. Es una alternativa a la terapia hormonal sustitutiva.
- Las Vitamina B12, B6 y los folatos ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal, lo que ayuda al estado de ánimo.
- Además, la Vitamina B6 ayuda a regular la actividad hormonal.
- La Vitamina D, K y calcio contribuyen al mantenimiento de los huesos.

FLAVIA NOCTA

Flavia Nocta añade a la fórmula anterior 2 nuevos componentes que además de aliviar los signos propios de la menopausia, ayudan a las mujeres con problemas para conciliar el sueño.

- El Lúpulo (*Humulus Lupulis L.*) ayuda a aliviar molestias como sofocos, sudoración, inquietud e irritabilidad.
- La Melatonina contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.

FLAVIA LIBITAL

Flavia Libital además de ayudar a aliviar los signos de la menopausia, ayuda a aumentar la libido gracias a la incorporación los siguientes ingredientes en su fórmula:

- El Azafrán que contiene crocinas y safranal reconocidos por ayudar a estimular la libido.
- El Fenogreco que es una fuente natural de saponinas y otros fitonutientes.
- Las isoflavonas de soja que tienen una estructura muy parecida a la de las hormonas sexuales femeninas y garantizan el aporte de Genisteína y Daidzeina.



ESTIMULA LA LIBIDO · SUDORACIÓN SOFOCOS · CONCILIACIÓN DEL SUEÑO · CANSANCIO FATIGA · IRRITABILIDAD · MANTENIMIENTO DE LOS HUESOS

1. IQVIA mercado de productos Menopausia, ventas en Farmacia a TAM Enero 2024.

Presentaciones y código nacional

Flavia Plus	Flavia Nocta	Flavia Libital
30 cápsulas	30 cápsulas	30 comprimidos
C.N. 170680.5	C.N. 178687.6	C.N. 220071.5
8 470001 706805	8 470001 786876	8 430340 065605

Talquistina®

TALCO, CREMA Y LOCIÓN

Para pieles sensibles e irritadas

TALQUISTINA TALCO Y CREMA

La acción balsámica y calmante de la Calamina proporciona un alivio eficaz del picor en la piel irritada o sensibilizada por alguna causa externa. **Talquistina Crema** además incorpora Rhamnosoft con propiedades antiirritantes y que atenúan el enrojecimiento.



TALQUISTINA LOCIÓN

La nueva **Talquistina Loción** contiene Calamina y también Rhamnosoft. Su textura fluida permite una fácil y cómoda aplicación en zonas extensas y se absorbe muy fácilmente. Indicada para el alivio del picor por causas cotidianas como depilación, rozaduras, piel sensible, piel seca, escozor, etc.

• Testados bajo control dermatológico.



Presentaciones y código nacional

Talquistina Talco 50 g
C.N. 152729.5
8 470001 527295

Talquistina Crema 50 ml
C.N. 158655.1
8 470001 586551

Talquistina Crema 100 ml
C.N. 163412.2
8 470001 634122

Talquistina Loción 200 ml
C.N. 189317.8
8 470001 893178

Talquistina®

CREMA HIDRATANTE

Para pieles sensibles con picor



Talquistina Crema Hidratante de uso diario, está especialmente desarrollada para el cuidado diario de pieles sensibles con picor ya que proporciona un cuidado y una hidratación de larga duración.

PROTEGE, HIDRATA Y CALMA LA SEQUEDAD Y EL PICOR EN LA PIEL

Con el innovador Calm Agent, formulado a base de:

- Dihidroavenantramida D: una molécula exclusivamente desarrollada potenciando los beneficios de la avena, que actúa de manera eficaz calmando y aliviando las pieles sensibles con picor.
- Aceite de Avena y Manteca de Karité: ingredientes naturales, que proporcionan hidratación de larga duración y restauran la barrera lipídica de la piel, aportando un alivio rápido, eficaz y duradero en las pieles sensibles con picor.

Apta para pieles sensibles

Dermatológicamente testada

Presentación y código nacional

Talquistina Crema Hidratante 400 ml
C.N. 208872.6
8 470002 088726

Talquistina® POSTPICA

Alivio eficaz del picor

Talquistina PostPica es un gel suave y eficaz, avalado por el éxito de Talquistina, que alivia y calma rápidamente las molestias ocasionadas por insectos, medusas o plantas. Especialmente indicado para todo tipo de pieles, incluyendo las más sensibles, que buscan fórmulas específicas para calmar la piel.

Su fórmula patentada incorpora Zanthoxylum (proporciona alivio del picor) Palmitoyl Tripeptide-8 (calma y suaviza la irritación de la piel) y Menthyl y Lauryl PCA (refrescan e hidratan la piel agredida). Esta combinación de ingredientes alcanza una disminución del 100% del área de enrojecimiento a los 90 minutos de su aplicación, así como un 100% de la disminución del picor a los 60 minutos.





Presentación y código nacional

Talquistina PostPica 15 ml
C.N. 215366.0

8 470002 153660

Talquistina TATTOO

Cuidado de la piel tatuada



Talquistina Tattoo es una crema indicada para el cuidado de la piel tatuada. Ayuda a mantener el tatuaje en buen estado proporcionando 24 horas de hidratación.

- Mantiene el brillo, la definición y los colores del tatuaje en buen estado.
- Textura de fácil absorción.
- Factor de protección solar SPF 25.
- Apto para pieles sensibles.

Gracias a su composición **Talquistina Tattoo** consigue una acción reparadora, hidratante, reestructurante y antioxidante.

- ACEITE DE ROSA MOSQUETA
  Regenera, revitaliza y repara la epidermis.
- AQUAXYL™
  Mejora la función barrera de la piel.
  Reestructurante.
  Hidrata la piel.
- MANTECA DE KARITE
  Con propiedades antioxidantes y reparadoras.
  Hidrata en profundidad.

Presentación y código nacional

Talquistina Tattoo 70 ml
C.N. 195155.7

8 470001 951557

BALSODERM
CUIDADO POST SOLAR

Calma y refresca la piel después del sol

La gama de **Balsoderm Post Solar** ha sido desarrollada con el objetivo de cuidar la piel después del sol.

Balsoderm Post Solar ha sido formulado con principios activos idóneos para restablecer el equilibrio lipídico de la piel tras la exposición solar.

BALSODERM POST SOLAR
Calma, Hidrata y Refresca

- Efecto calmante (Alfa Bisabolol) y balsámico (Extracto de Camomila).
- Acción Hidratante y antirradicales libres (Pirrolidón Carboxilato Sódico, Aceites Vegetales y Vitamina E).
- Dermatológicamente testado.

BALSODERM POST SOLAR INTENSIVE
Calma, Hidrata y Repara la piel después del sol

- Efecto calmante.
- Restablece el equilibrio de la piel tras la exposición solar de forma inmediata.
- Hidrata y repara profundamente.
- Dermatológicamente testado.



Presentaciones y código nacional

Balsoderm PS Corporal 300 ml
C.N. 243295.6

Balsoderm PS Intensive Crema 200 ml
C.N. 168842.2

Balsoderm PS Intensive Spray 200 ml
C.N. 169471.3

virlix *plus*

Alivio temporal de los síntomas de la alergia y descongestionante nasal

Alivio temporal de la congestión nasal y demás síntomas asociados a las alergias, tales como estornudos, goteo nasal, picor nasal y picor de los ojos, producidos por el polen de las plantas, animales domésticos, polvo u otros agentes alergénicos, cuando se requiera la actividad antialérgica junto con la descongestión nasal.



Composición:
Cetirizina + pseudoefedrina

Presentación y código nacional

Virlix Plus
14 comprimidos EFP
C.N. 659672.2

VIRLIX PLUS

NOMBRE DEL MEDICAMENTO: VIRLIX PLUS 5 mg/120 mg comprimidos de liberación prolongada. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Cada comprimido contiene 5 mg de cetirizina dihidrocloruro formulado para liberación inmediata y 120 mg de pseudoefedrina hidrocloruro formulado para liberación prolongada. Excipientes: ***Primera capa:*** Hipromelosa (E 464), Celulosa microcristalina, Sílice coloidal anhidra, Estearato de magnesio. ***Segunda capa:*** Lactosa 43,23mg, Celulosa microcristalina, Croscarmelosa de sodio, Sílice coloidal anhidra, Estearato de magnesio. ***Película de recubrimiento:*** Opadry Y-1-7000 que contiene: Hipromelosa (E 464), Dióxido de titanio (E 171), Macrogol 400. **FORMA FARMACÉUTICA:** Comprimidos de liberación prolongada. Comprimidos blancos o casi blancos, redondos y biconvexos. **DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas:** VIRLIX PLUS está indicado para el tratamiento de los síntomas nasales y oculares de la rinitis alérgica estacional cuando se acompaña de congestión nasal en adultos y adolescentes a partir de 12 años. **Posología y forma de administración:** Posología: Adultos y adolescentes a partir de 12 años: 1 comprimido 2 veces al día (por la mañana y por la noche); máximo 2 comprimidos en 24 horas. Mayores de 60 años: Esta asociación no deberá administrarse a pacientes de edad superior a 60 años (ver advertencias y precauciones especiales de empleo). Pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave: No hay datos para documentar la relación eficacia/seguridad en pacientes con insuficiencia renal. Ya que la cetirizina se elimina principalmente por vía renal en casos en los que no se pueda utilizar un tratamiento alternativo, se deberán individualizar los intervalos de dosificación de acuerdo con la función renal. Consulte la siguiente tabla y ajuste la dosis según proceda. Para utilizar esta tabla de dosificación, es preciso disponer de una estimación del aclaramiento de creatinina (CLcr) del paciente, en ml/min. El valor de CLcr (en ml/min) se puede estimar a partir de la determinación de creatinina en suero (mg/dl) mediante la siguiente fórmula:

$$CLcr = \frac{[140 - \text{edad (años)}] \times \text{peso (kg)}}{72 \times \text{creatinina en suero (mg/dl)}} \quad (\times 0{,}85 \text{ para mujeres})$$

Ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal:

Grupo	*Aclaramiento de creatinina (ml/min)*	*Dosis y frecuencia*
Normal	⩾ 80	10 mg una vez al día
Leve	50 – 79	10 mg una vez al día
Moderada	30 – 49	5 mg una vez al día
Grave	<30	5 mg una vez cada 2 días
Enfermedad renal terminal – pacientes que precisan diálisis	<10	Contraindicado

Pacientes con insuficiecia hepática: Esta combinación no deberá administrarse a pacientes con insuficiencia hepática. *Población pediátrica:* VIRLIX PLUS está contraindicado en niños menores de 12 años (ver contraindicaciones). Forma de administración: Los comprimidos deben ingerirse enteros con ayuda de algún líquido, y no se deben partir, masticar, ni triturar. La duración del tratamiento deberá ser lo más breve posible y no debe exceder de 7 días. El tratamiento no deberá continuar una vez desaparecidos los síntomas. La toma concomitante de este medicamento con comidas o bebidas no afecta a la eficacia del mismo. **Contraindicaciones:** Cetirizina-pseudoefedrina está contraindicado en pacientes con: hipersensibilidad a los principios activos, a efedrina, a cualquier piperazina, o a alguno de los excipientes, hipertensión arterial grave o insuficiencia coronaria grave, insuficiencia renal grave, hipertiroidismo no controlado, arritmias graves, feocromocitoma, glaucoma de ángulo cerrado, hipertrofia de próstata, retención urinaria, antecedentes de accidente cerebrovascular, riesgo elevado de sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico. Cetirizina-pseudoefedrina está contraindicado en pacientes tratados de forma concomitante con: dihidroergotamina, inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAOs) hasta dos semanas después de haber finalizado este tratamiento. Virlix Plus está contraindicado en niños menores de 12 años (ver posología y contraindicaciones). **Advertencias y precauciones especiales de empleo:** Cetirizina-pseudoefedrina, debido a que contiene pseudoefedrina debe utilizarse con precaución en pacientes con diabetes, hipertiroidismo, hipertensión arterial, taquicardia, arritmia cardiaca, isquemia cardiaca, insuficiencia renal o hepática moderada y en ancianos. Cetirizina-pseudoefedrina está contraindicado en niños menores de 12 años (ver indicaciones terápeuticas y posología) ya que no se han realizado estudios en este grupo de pacientes. También debe utilizarse con precaución en pacientes que estén tomando: Medicamentos simpático-miméticos tales como descongestionantes, inhibidores del apetito, y psicoestimulantes, tales como anfetaminas (efectos combinados en el sistema cardiovascular), antidepresivos tricíclicos, medicamentos antihipertensivos (efectos de los medicamentos antihipertensivos reducidos), (ver interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción), alcohol u otros depresores del sistema nervioso central (SNC) (aumentan la depresión del SNC y los problemas para realizar acciones), glucósidos cardiacos, tales como digoxina o digitoxina (riesgo de arritmia cardiaca). También, debe prestarse atención a pacientes con factores que puedan incrementar el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico, (como el uso concomitante de vasoconstrictores (ej. bromocriptina, pergolida, lisurida, cabergolina, ergotamina), o cualquier otro medicamento descongestionante (ej. fenilpropanolamina, fenilefrina, efedrina) usado por vía oral o nasal, debido al riesgo de vasoconstricción y de aumento de la presión arterial. Debido al efecto vasoconstrictor de la pseudoefedrina, se requiere precaución en pacientes que tienen riesgo de hipercoagulación, por ejemplo en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Se requiere precaución en pacientes hipertensos que están siendo tratados concomitantemente con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), ya que ambos, la pseudoefedrina y los AINEs, pueden aumentar la presión sanguínea. Al igual que con otros estimulantes centrales, se ha observado abuso a la pseudoefedrina. Este medicamento contiene pseudoefedrina hidrocloruro, que puede dar lugar a un resultado positivo en el Control de Dopaje que se practica a los deportistas. Advertencia sobre excipientes: Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabsorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:** No se han realizado estudios de interacción con el medicamento combinado de cetirizina-pseudoefedrina. Se han realizado estudios de interacciones farmacocinéticas con cetirizina y cimetidina, ketoconazol, eritromicina, azitromicina, antipirina o pseudoefedrina; no se han observado interacciones farmacocinéticas. En un estudio dosis múltiple de teofilina (400 mg una vez al día) y cetirizina, hubo una pequeña disminución (16%) en el aclaramiento de la cetirizina, mientras que la exposición a la teofilina no se alteró por el uso concomitante con cetirizina. Estudios con cetirizina y cimetidina, glipizida, diazepam o pseudoefedrina no han revelado evidencia de interacciones farmacodinámicas. Estudios con cetirizina y azitromicina, eritromicina, ketoconazol, teofilina, antipirina o pseudoefedrina no han revelado evidencia de interacciones clínicas. En particular, la administración concomitante de cetirizina con macrólidos o ketoconazol nunca ha provocado cambios clínicamente relevantes en el electrocardiograma (ECG). En un estudio dosis múltiple con ritonavir (600 mg dos veces al día) y cetirizina (10 mg al día), el grado de exposición de cetirizina se incrementó alrededor del 40% mientras que la exposición a ritonavir se alteró ligeramente (-11%) tras la administración concomitante con cetirizina. El uso concomitante de aminas simpaticomiméticas con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAOs) puede dar lugar a crisis hipertensivas. Debido a la acción prolongada de los IMAOs, dicha interacción aún es posible en los 15 días siguientes tras la interrupción del tratamiento. Las aminas simpaticomiméticas reducen el efecto antihipertensivo de los bloqueantes beta-adrenérgicos y de medicamentos que interfieran con la actividad simpática, tales como la metildopa, guanetidina y reserpina (ver advertencias y precauciones especiales de empleo). La administración de linezolida con pseudoefedrina puede resultar en un incremento de la presión sanguínea en pacientes con presión normal. El uso concomitante de pseudoefedrina con glucósidos cardiacos, tales como digoxina o digitoxina en pacientes con marcapasos puede incrementar la respuesta al estímulo de éste; por lo tanto, el uso de cetirizina-pseudoefedrina debe evitarse en pacientes tratados con glucósidos cardiacos (ver advertencias y precauciones especiales de empleo). Los antiácidos e inhibidores de la bomba de protones incrementan el grado de absorción de la pseudoefedrina; el caolín la disminuye. El uso concomitante con agentes anestésicos halogenados puede provocar o empeorar la arritmia ventricular. La cetirizina inhibe las pruebas cutáneas de alergia, por lo que se debe suprimir el tratamiento con cetirizina-pseudoefedrina durante 3 días antes de realizarlas. Comidas altas en grasa no modificaron la biodisponibilidad de ambos principios activos del medicamento. Sin embargo redujeron y retrasaron el pico de concentración plasmática de cetirizina. **Fertilidad, embarazo y lactancia:** Embarazo: No hay datos adecuados del uso de cetirizina-pseudoefedrina en embarazadas. *Virlix Plus no se recomienda durante el embarazo.* El uso de pseudoefedrina durante el primer trimestre de embarazo ha sido asociado con un incremento de la frecuencia de gastrosquisis (defecto en el desarrollo de la pared intestinal con hernia intestinal) y de atresia del intestino delgado (obstrucción congénita del intestino delgado). Debido a las propiedades vasoconstrictoras de la pseudoefedrina, no debe usarse durante el tercer trimestre del embarazo, ya que puede inducir una reducción en la circulación utero-placentaria. Los datos en un número limitado de mujeres embarazadas expuestas indicaron que la cetirizina no produjo efectos adversos en embarazadas o en la salud del feto/recién nacido. Los datos en animales relacionados con el embarazo, desarrollo embriofetal, parto o desarrollo post-natal son insuficientes. Lactancia: Cetirizina y pseudoefedrina se excretan en la leche materna. Por lo tanto, Virlix Plus no está recomendado en mujeres en periodo de lactancia. Fertilidad: No hay datos disponibles sobre la fertilidad en humanos. Un estudio en ratas no reveló ningún impacto sobre la fertilidad de la combinación de cetirizina: pseudoefedrina (1:24). Se observaron cambios en la morfología y recuento espermático en ratas macho que recibieron pseudoefedrina por vía intraperitoneal. **Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:** Los pacientes que vayan a conducir vehículos, realizar actividades potencialmente peligrosas o manejar maquinaria no deben exceder la dosis recomendada y deben tener en cuenta la respuesta individual al medicamento. Los pacientes que experimenten somnolencia deben abstenerse de conducir, realizar actividades potencialmente peligrosas o manejar maquinaria. Pacientes a los que se les administró cetirizina a la dosis aprobada de 10 mg/día, no mostraron ningún efecto clínico relevante en las medidas objetivas sobre la capacidad para conducir, función cognoscitiva, la respuesta motora o la latencia al sueño. Sin embargo, el uso conjunto de cetirizina con alcohol y otras sustancias con actividad depresora del SNC pueden causar reducciones adicionales en el estado de alerta y disminución de la actividad. No se han notificado ni se esperan efectos negativos de la pseudoefedrina sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas.Debería tenerse en cuenta que variaciones en estos efectos existen con diferentes medicamentos en diferentes individuos: en ensayos clínicos, se han notificado casos de sensación subjetiva de somnolencia. A dosis superiores a las recomendadas como normales, pueden aparecer efectos del sistema nervioso central.

Reacciones adversas: Estudios clínicos: *Resumen:* En estudios controlados se han descrito reacciones adversas, en algo más del 1 % de los pacientes tratados con cetirizina/pseudoefedrina, que no difieren de las descritas individualmente para cetirizina o pseudoefedrina. Experiencia post-comercialización: Los efectos adversos encontrados por el uso de cetirizina se relacionan principalmente con efectos depresores sobre el SNC o efectos paradójicos estimulantes del SNC, con actividad de tipo anticolinérgica o con reacciones de hipersensibilidad (incluyendo shock anafiláctico), mientras que los efectos adversos por el uso de pseudoefedrina es más probable que estén relacionados con estimulación del SNC, y trastornos cardiovasculares. Se han identificado en publicaciones literarias casos aislados de accidente cerebrovascular y colitis isquémica por el uso de pseudoefedrina. Se han notificado las siguientes reacciones adversas. Se muestran de acuerdo a MedDRA, Clasificación Órgano-Sistema y por frecuencia estimada. Las frecuencias se definen como: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100, <1/10); poco frecuentes (≥ 1/1.000, <1/100); raras (≥1/10.000, <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). *Trastornos del sistema inmunológico: Raros:* reacciones de hipersensibilidad (incluido shock anafiláctico). *Trastornos psiquiátricos: Frecuentes:* nerviosismo, insomnio. *Poco frecuentes:* ansiedad, agitación. *Raros:* alucinaciones. *Muy raros:* trastornos psicóticos. *Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes:* vértigo, mareos, dolor de cabeza, somnolencia. *Raros:* convulsiones, temblor. *Muy raros:* disgeusia, accidentes cerebrovasculares (derrame cerebral). *Trastornos oculares: Frecuencia no conocida:* trastornos de la acomodación visual, visión borrosa, midriasis, dolor ocular, deterioro visual, fotofobia. *Trastornos cardiacos: Frecuentes:* taquicardia. *Raros:* arritmia. *Frecuencia no conocida:* palpitaciones. *Trastornos vasculares: Raros:* palidez, hipertensión. *Muy raros:* colapso cardiovascular. *Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Frecuencia no conocida:* disnea. *Trastornos gastrointestinales: Frecuentes:* sequedad de boca, náuseas. *Raros:* vómitos. *Frecuencia no conocida:* colitis isquémica. *Trastornos hepatobiliares: Raros:* trastornos en la función hepática (aumento de las transaminasas, de la fosfatasa alcalina, gamma-GT, bilirrubina). *Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Raros:* piel seca, prurito, aumento de la sudoración, urticaria. *Muy raros:* erupción asociada al medicamento, edema angioneurótico. *Frecuencia no conocida:* pustulosis exantemática generalizada aguda. *Trastornos renales y urinarios: Raros:* disuria. *Trastornos del aparato reproductor y de la mama: Frecuencia no conocida:* disfunción eréctil. *Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Frecuentes:* astenia. **Sobredosis:** Los síntomas observados después de una sobredosis de cetirizina están principalmente asociados con efectos sobre el SNC o con efectos que podrían sugerir un efecto anticolinérgico. En dosis prolongadas, los simpaticomiméticos pueden inducir una psicosis tóxica con delirio y alucinaciones. Algunos pacientes pueden desarrollar arritmias cardiacas, colapso circulatorio, convulsiones, coma o fracaso respiratorio, que puede ser letal. La sobredosis aguda con cetirizina-pseudoefedrina puede producir diarrea, mareos, fatiga, dolor de cabeza, malestar general, midriasis, retención urinaria, taquicardia, arritmia cardiaca, hipertensión arterial o signos de depresión (sedación, apnea, inconsciencia, cianosis y colapso cardiovascular) o de estimulación (insomnio, alucinaciones, temblor, crisis epilépticas) del SNC, que pueden ser fatales. El tratamiento de la sobredosis, preferiblemente en el hospital, debe ser sintomático y de sostén, teniendo en consideración cualquier otra medicación ingerida concomitantemente. Deberá inducirse el vómito si éste no se ha producido espontáneamente. Se recomienda lavado gástrico. No existen antídotos conocidos. No deben usarse aminas simpaticomiméticas. La hipertensión y la taquicardia pueden controlarse con el uso de bloqueantes alfa-adrenérgicos y/o bloqueantes beta-adrenérgicos. Las crisis epilépticas pueden tratarse con diazepam intravenoso (o con diazepam vía rectal en niños). Cetirizina y pseudoefedrina se eliminan poco por hemodiálisis. **DATOS FARMACÉUTICOS: Incompatibilidades:** No se conocen incompatibilidades. **Periodo de validez:** 3 años. **Precauciones especiales de conservación:** No requiere condiciones especiales de conservación. **Naturaleza y contenido del envase:** Los comprimidos se acondicionan en blisters termoformados de PVC/aluminio. Lámina de PVC: transparente, no plastificada y fisiológicamente inerte. Lámina de aluminio: cara interior con laca termosellante de PVC, cara exterior con laca protectora incolora. Cada envase de la especialidad contiene 14 comprimidos de liberación prolongada. **Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones:** Ninguna especial. **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** LÁCER, S.A., Sardenya, 350, 08025 Barcelona (España). **NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** 62103. Medicamento no sujeto a prescripción médica. **FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN:** Mayo 2003. **FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO:** Junio 2017.

THROMBOCID

NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Thrombocid 1 mg/g pomada. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Cada gramo de pomada contiene: Pentosano polisulfato sódico 1 mg. Excipientes: Alcohol cetoestearílico 106,7 mg, Cetoestearilo sulfato sódico (E540i), Aceite de ricino polioxietilenado 9 mg, Butil hidroxianisol (E320) 0,012 mg, Ácido cítrico (E330), Oleato de decilo, Sorbitol (E420i), Propilenglicol 7,5 mg, Ácido sórbico (E200)
2 mg, Parahidroxibenzoato de etilo (E214) 1,16 mg, Parahidroxibenzoato de propilo (E216) 0,44 mg, Guayazuleno, Timol, Agua. **FORMA FARMACÉUTICA:** Pomada. **DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas:** Tratamiento local sintomático de los trastornos venosos superficiales como pesadez y tirantez en piernas con varices en adultos y de hematomas superficiales producidos por golpes, en adultos y niños mayores de 1 año. **Posología y forma de administración:** Uso cutáneo. Adultos y niños mayores de 1 año: aplicar 3 o 4 veces al día una fina capa de pomada en la zona afectada, distribuyéndola con un suave masaje. No es necesario cubrir con un vendaje, pero puede cubrirse con una gasa o compresa si es necesario. Niños menores de 1 año: dado que no se han realizado estudios sobre seguridad y eficacia en niños menores de 1 año, no se recomienda su uso en éstos. Si los síntomas persisten más de 5 días o se produce irritación o empeoramiento, deberá evaluarse la situación clínica del paciente. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Pacientes con manifestaciones hemorrágicas o alteraciones importantes de la hemostasia. No aplicar nunca sobre las mucosas, úlceras y heridas abiertas o infectadas. **Advertencias y precauciones especiales de empleo:** Utilizar sólo en piel intacta. Evitar el contacto con los ojos. En caso de problemas venosos de origen trombótico (como por ejemplo tromboembolismo) se recomienda aplicar el producto suavemente y sin masaje. No utilizar de forma prolongada ni en zonas muy extensas de la piel. Valorar situación clínica si el paciente sufre de alguna otra dolencia, es alérgico o está utilizando algún otro medicamento. ***Advertencias sobre excipientes:*** Este medicamento puede causar reacciones en la piel porque contiene aceite de ricino polioxietilenado. Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetoestearílico y ácido sórbico. Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) o irritación de los ojos y membranas mucosas porque contiene butilhidroxianisol. Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de etilo (E214) y parahidroxibenzoato de propilo (E216). Este medicamento puede producir irritación de la piel porque contiene Propilenglicol. **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:** Aunque no se ha descrito hasta el momento ninguna interacción medicamentosa con el uso cutáneo de este medicamento, el médico o farmacéutico debe valorar su utilización conjunta con otros fármacos aplicados por esta vía. **Fertilidad, embarazo y lactancia:** Puesto que no existe una experiencia clínica adecuada sobre la seguridad del pentosano polisulfato sódico por vía tópica durante el embarazo y la lactancia, se recomienda no utilizarlo en estas situaciones salvo mejor criterio médico. **Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:** La influencia de Thrombocid sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. **Reacciones adversas:** Se han descrito reacciones alérgicas ocasionales. *Clasificación de órganos:* Trastornos del sistema inmunológico. *Frecuencia estimada:* Muy Raros (<1/10.000). *Efectos adversos:* Hipersensibilidad. En caso de observar la aparición de reacciones adversas, se deben notificar a los sistemas de Farmacovigilancia y, si fuera necesario, suspender el tratamiento. **Sobredosis:** En el caso de sobredosificación por vía tópica, pueden aparecer signos de irritación de la piel o producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto)En el caso de ingestión accidental del contenido del tubo, se recomienda beber una buena cantidad de agua u otro líquido acuoso y, si aparecieran trastornos digestivos, acudir a un centro hospitalario y aplicar tratamiento sintomático. **DATOS FARMACÉUTICOS: Incompatibilidades:** No procede. **Periodo de validez:** 3 años. **Precauciones especiales de conservación:** Mantener el tubo perfectamente cerrado. **Naturaleza y contenido del envase:** Tubo de aluminio conteniendo 30 y 60 g de pomada. Envase clínico conteniendo 100 tubos de 60 g de pomada. **Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones:** La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** LACER, S.A., C/. Sardenya, 350, 08025 Barcelona. **NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** 32762. Medicamentos no sujeto a prescripción médica. **FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN:** 26 de Octubre 1959. **FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO:** Octubre 2001.

THROMBOCID FORTE

NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Thrombocid Forte 5 mg/g pomada. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Cada gramo de pomada contiene: Pentosano polisulfato sódico 5 mg. Excipientes: Alcohol cetoestearílico 144 mg. Propilenglicol 50 mg. Parahidroxibenzoato de metilo (E218) 1,3 mg. Parahidroxibenzoato de etilo (E214) 1,3 mg. Ver epígrafe lista de excipientes. **FORMA FARMACÉUTICA:** Pomada de color blanco. **DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas:** Tratamiento local sintomático de los trastornos venosos superficiales como pesadez y tirantez en piernas con varices en adultos y de hematomas superficiales producidos por golpes, en adultos y niños mayores de 1 año. **Posología y forma de administración:** Uso cutáneo. Adultos y niños mayores de 1 año: aplicar 3 o 4 veces al día una fina capa de pomada a lo largo de la zona afectada, distribuyéndola con un suave masaje. De ordinario no hace falta vendaje, pero puede cubrirse con una gasa o compresa si es necesario. Niños menores de 1 año: no se haestablecido la seguridad y eficacia de Thrombocid Forte en niños menores de 1 año. Si los síntomas persisten más de 5 días o se produce irritación o empeoramiento, deberá evaluarse la situación clínica del paciente. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquiera de los componentes de este medicamento. Pacientes con manifestaciones hemorrágicas o alteraciones importantes de la hemostasia. No aplicar nunca sobre las mucosas, úlceras y heridas abiertas o infectadas. **Advertencias y precauciones especiales de empleo:** Utilizar sólo en piel intacta. Evitar el contacto con los ojos. En caso de problemas venosos de origen trombótico (como por ejemplo tromboembolismo) se recomienda aplicar el producto suavemente y sin masaje. No utilizar de forma prolongada ni en zonas muy extensas de la piel. Valorar situación clínica si el paciente sufre de alguna otra dolencia, es alérgico o está utilizando algún otro medicamento. **Advertencias sobre excipientes:** Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetoestearílico. Este medicamento puede producir irritación de la piel porque contiene propilenglicol. Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de metilo (E218) y parahidroxibenzoato de etilo (E214). **Interacciones con**

otros medicamentos y otras formas de interacción: Aunque no se ha descrito hasta el momento ninguna interacción medicamentosa con el uso cutáneo de este medicamento, el médico o farmacéutico deberían valorar su utilización conjunta con otros fármacos aplicados por esta vía. **Fertilidad, embarazo y lactancia:** No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de pentosano polisulfato sódico en mujeres embarazadas o en período de lactancia. Los estudios realizados en animales son insuficientes en términos de toxicidad para la reproducción. No se recomienda utilizar Thrombocid Forte durante el embarazo. **Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:** La influencia de Thrombocid Forte sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. **Reacciones adversas:** Se han notificado las siguientes reacciones adversas. Se muestran de acuerdo a MedDRA, Clasificación Órgano-Sistema y por frecuencia estimada. Las frecuencias se definen como: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100, <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000, <1/100); raras (≥1/10.000, <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Clasificación de órganos: Trastornos del sistema inmunológico. Frecuencia estimada: Muy rara. Efectos adversos: Hipersensibilidad. En caso de observarse la aparición de reacciones adversas debe suspenderse el tratamiento y notificarlas a los sistemas de Farmacovigilancia. **Sobredosis:** Siguiendo correctamente las instrucciones descritas en las indicaciones y la posología, es muy difícil que aparezcan signos o síntomas de intoxicación. En el caso de ingestión accidental del contenido del tubo, se recomienda beber una buena cantidad de agua u otro líquido acuoso y, si aparecieran trastornos digestivos, acudir a un centro hospitalario y aplicar tratamiento sintomático. **DATOS FARMACÉUTICOS:** Lista de excipientes: Alcohol cetoestearílico, Cetomacrogol 1000, Glicerol (E422), Propilenglicol, Oleato de decilo, Fenoxietanol, Parahidroxibenzoato de metilo (E218), Parahidroxibenzoato de etilo (E214), Agua. **Incompatibilidades:** No procede. **Naturaleza y contenido del envase:** Tubos de aluminio conteniendo 60 g y 100 g de pomada. **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** LACER, S.A., C/. Sardenya, 350, 08025 Barcelona (España). Medicamento no sujeto a prescripción médica. **FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Noviembre 2001.**

ANSO

NOMBRE DEL MEDICAMENTO: ANSO pomada rectal. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Cada gramo de pomada contiene: Lidocaína hidrocloruro, 20 mg, (2%), Pentosano polisulfato sodio, 10 mg (1%), Triamcinolona acetónido, 0,1 mg (0,01%). Excipientes: Alcohol cetoestearílico 146,7 mg, Cetoestearilsulfato de sodio, Aceite de ricino, polioxietilenado 11,25 mg, Butilhidroxianisol (E320) 0,018 mg, Ácido cítrico (E330), Macrogol éter cetoestearílico, Oleato de decilo, Etil parahidroxibenzoato de sodio (E215) 1,5 mg, Metil parahidroxibenzoato de sodio (E219) 2 mg, Hexilresorcinol , Sorbitol (E420), Propilenglicol 7,5 mg, Edetato disódico, Timol, Hexetidina, Agua purificada. **FORMA FARMACÉUTICA:** Pomada rectal. **DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas:** Tratamiento local sintomático de las manifestaciones asociadas con hemorroides, como la inflamación, el dolor, el picor o el escozor. Anso pomada está indicado en adultos mayores de 18 años. **Posología y forma de administración:** Posología: Adultos mayores de 18 años: Aplicar de 1 a 3 veces al día una cantidad de pomada equivalente a 1-2 cm sobre el área a tratar. Forma de administración: Uso anal y/o rectal. Se recomienda hacer las aplicaciones después de la evacuación intestinal y aseo personal. Previamente a la aplicación debe limpiarse con cuidado la zona afectada con agua templada y jabón. Se aplicará un volumen de pomada en la región anal con un dedo, utilizando la punta del dedo para vencer la resistencia del esfínter. Si la pomada se ha de aplicar en el interior del recto, se enrosca en el tubo el aplicador adjunto y se inserta la punta en el ano. A continuación, se puede aplicar una pequeña cantidad de pomada ejerciendo una ligera presión sobre el tubo. Si los síntomas se agravan o persisten a los 7 días de tratamiento, se debe revisar la situación clínica. *Población pediátrica:* No se dispone de datos. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a los principios activos, a los anestésicos locales de tipo amida, a los compuestos relacionados con pentosano polisulfato sodio o a alguno de los excipientes. Hemorragia hemorroidal. Infecciones bacterianas, víricas (ej., herpes) o fúngicas de la región a tratar. **Advertencias y precauciones especiales de empleo:** En caso de irritación en la zona de aplicación, deberá suspenderse el empleo de la pomada y, si es necesario, se instaurará tratamiento adecuado. En caso de que la mucosa esté irritada, infectada o herida, aumenta el riesgo de absorción sistémica y la toxicidad. Evitar el contacto con los ojos y zonas próximas a los mismos, así como con otras mucosas. Se aconseja lavarse bien las manos después de la aplicación. La aplicación de dosis excesivas o durante periodos prolongados, o bien con oclusión o pañales, puede dar lugar a que se presenten efectos sistémicos (hipertensión, síndrome de Cushing) debido a la mayor cantidad absorbida (ver reacciones adversas). Si se presenta una infección asociada, conviene incorporar tratamiento específico complementario. De no tener lugar una rápida mejoría, debe suspenderse el tratamiento hasta que se haya controlado la infección. Se debe tener precaución en caso de administración conjunta con medicamentos como anticoagulantes y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), ya que podría aumentar el riesgo de sangrado por efectos aditivos, aunque no se ha evidenciado en Anso pomada rectal como riesgo identificado durante la experiencia postcomercialización. Se recomienda precaución en ancianos, enfermos con una mucosa gravemente traumatizada o debilitados, ya que pueden ser más sensibles a los efectos sistémicos de los principios activos del medicamento. Advertencias sobre excipientes: Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetoestearílico y butilhidroxianisol (E320) y además irritación de los ojos y membranas mucosas porque contiene butilhidroxianisol (E320). Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene etil parahidroxibenzoato de sodio (E215) y metil parahidroxibenzoato de sodio (E219); así como irritación en la piel porque contiene propilenglicol. Puede causar reacciones en la piel porque contiene aceite de ricino polioxietilenado. Advertencia a los deportistas: Se debe informar a los deportistas que este medicamento contiene un componente (triamcinolona) que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo. *Población pediátrica:* No se debe utilizar Anso pomada rectal en niños y adolescentes, ya que no se han realizado estudios clínicos con éstos. Los niños son más susceptibles a padecer toxicidad sistémica inducida por corticosteroides exógenos a dosis equivalentes que los adultos, y por tanto son más susceptibles a la toxicidad de Anso pomada rectal. Son más suceptibles a la supresión del eje hipotálamo-hipófisis-suprerrenal y síndrome de Cushing que los adultos. La administración de corticosteroides tópicos en niños, en su caso, se debe limitar a la menor cantidad clínicamente eficaz y no se deben usar materiales ajustados como algunos pañales que causan oclusión. **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:** La lidocaína debe administrarse con precaución en pacientes que están siendo tratados con fármacos antiarrítmicos. Como consecuencia de la absorción de la triamcinolona acetónido, los tratamientos con dosis excesivas o los de larga duración podrían dar lugar a interacciones similares a aquellas que se producen con el tratamiento sistémico. Hasta el momento no se conocen. **Fertilidad, embarazo y lactancia:** Embarazo: No existen datos suficientes sobre la utilización de lidocaína ni triamcinolona acetónido en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Los estudios realizados en animales con corticosteroides han mostrado toxicidad para la reproducción. El uso de Anso pomada rectal durante el embarazo debería reservarse para casos en los que el beneficio potencial fuera superior al posible riesgo para el feto o el recién nacido. En cualquier caso, no debe usarse en grandes cantidades o durante largos periodos de tiempo en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Lactancia: Lidocaína se excreta en la leche materna. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con Anso pomada rectal tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre. **Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:** La influencia de Anso pomada rectal sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. **Reacciones adversas:** Los efectos adversos que podrían producirse se deben fundamentalmente a un uso inadecuado, como dosis superiores a las recomendadas o con más frecuencia de la recomendada o uso en condiciones oclusivas. Los efectos adversos se clasifican por órganos y sistemas y por frecuencias de acuerdo con la convención MedDRA. Las frecuencias se definen como: poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1.000), muy raras (<1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). *Sistema de Clasificación de órganos:* 1) Transtornos del sistema inmunológico. *Frecuencia no conocida:* Hipersensibilidad con reacción alérgica y reacciones anafilácticas a la lidocaína que podrían producir angioedema, broncoespasmo, dermatitis, disnea, laringoespasmo, prurito, shock y urticaria. Dermatitis de contacto. 2) Transtornos de la piel y del tejido subcutáneo. *Poco frecuentes:* Pueden aparecer reacciones adversas de carácter local, como quemazón en la zona de aplicación, picor e irritación en el sitio de aplicación (más frecuentemente en caso de oclusión). *Raras:* Atrofia cutánea, telangiectasia, estrías en la piel, erupciones acneiformes, dermatitis perioral, eritema, hipopigmentación de la piel . *Frecuencia no conocida:* Sequedad, maceración dérmica, etc. Podrían producirse efectos adversos sistémicos debidos a la absorción de los corticosteroides cuando se usan en exceso, durante periodos prolongados, con oclusión o en niños; se podría producir supresión reversible del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal con manifestaciones de síndrome de Cushing (obesidad en el tronco, cara redondeada, acumulación de grasa en la zona cervical, retraso en la cicatrización, síntomas psiquiátricos, etc.) hipertensión, edema, cataratas (subcapsular), alopecia. Los niños son más sensibles a los efectos adversos de la lidocaína. **Sobredosis:** Una sobredosificación de corticosteroides (cantidades superiores a las recomendadas) aumenta el riesgo de efectos adversos y podría causar los efectos sistémicos de los mismos (ver reacciones adversas). En caso de aplicación excesiva de lidocaína, si se utiliza sobre áreas extensas de piel, con vendaje oclusivo o en piel irritada o herida, o si la temperatura de la piel aumenta, la cantidad de anestésico que se absorbe sistémicamente es impredecible y podrían aparecer reacciones graves como latidos irregulares, convulsiones, dificultad respiratoria. En caso de ingestión accidental del contenido del tubo, se recomienda realizar tratamiento sintomático. **DATOS FARMACÉUTICOS: Incompatibilidades:** No procede. **Periodo de validez:** 5 años. **Precauciones especiales de conservación:** Mantener el tubo perfectamente cerrado. **Naturaleza y contenido del envase:** Caja de cartón conteniendo tubo de aluminio con boquilla, tapón de rosca y cánula de polietileno con 50 g de pomada. **Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones:** La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** LACER, S.A., C/. Sardenya, 350, 08025 Barcelona (España). **NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** 51967. Medicamentos no sujeto a prescripción médica. **FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN:** 17/01/1974. **FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO:** 09/2016.

LACER, S.A.
C/ dels Boters, 5
Parc Tecnologic del Vallés
08290 Cerdanyola del Vallès

www.lacer.es
www.laceroralhealth.com
www.sangradogingival.com
www.pilexil.com
www.thrombocid.com
www.talquistina.com
www.quehacerconlashemorroides.com

PN/VAD25