Vademécum

Lacer Personal Health

Lacer

ITALFARMACO® GROUP

ÍNDICE

SALUD BUCODENTAL

Lacer Multiprotección 4
LacerFresh 6
Lacer Natur 8
LacerBlanc 10
LacerBlanc White Flash & Pincel Dental Blanqueador 12
Lacer Aligner 14
GingiLacer 16
SensiLacer 18
Lacer Oros 20
Lacer Junior & Infantil 22
Flúor Lacer 24
Clorhexidina Lacer 26
Lacer Mucorepair 28
XeroLacer 30
Lacer pro 32

HIGIENE BUCAL MECÁNICA

Lacer cepillos dentales 34
Lacer cepillos cabezal pequeño 36
Lacer cepillos dentales Mini 38
Lacer Hidro 40
Lacer Interdentales 42
Lacer Picks 44
Lacer Sedas dentales 46

CUIDADO Y TRATAMIENTO DEL CABELLO

Pilexil Anticaída Cápsulas Caída ocasional Hair Exposome TripleProtection 48
Pilexil Anticaída Ampollas Caída ocasional Hair Exposome TripleProtection 50 52
Pilexil Anticaída Forte Max 54
Pilexil Anticaída Champú Hair Exposome TripleProtection 56
Pilexil Acondicionador 58
Pilexil Anticaspa

CIRCULACIÓN PERIFÉRICA 60
Thrombocid

ANTIHEMORROIDALES 62
Anso 63
Ansollitas

MENOPAUSIA

Flavia 64
Ainara by Flavia 66

ANTIPRURIGINOSOS

Talquistina talco, crema y loción 68
Talquistina Crema Hidratante 69
Talquistina Oleogel de ducha 70
Talquistina REGENERA+ 72
Talquistina PostPica 74
Talquistina Tattoo 75

CUIDADO POST-SOLAR

Balsoderm post-solar 76

ANTIHISTAMÍNICOS

Virlix Plus 77

FICHAS TÉCNICAS 78

Lacer
ITALFARMACO® GROUP

Lacer®

Eficacia Multiprotección

La pasta dentífrica y el colutorio **Lacer** están indicados para prevenir la caries y mantener la boca sana a diario.

La pasta dentífrica **Lacer** gracias a su completa formulación ayuda mantener la boca sana y protegida:

- Acción antisarro
- Acción Anticaries
- Acción Antiplaca
- Acción Antimicrobiana
- Protege dientes y encías
- 5 veces más remineralizante
- 24 horas protección antiplaca
- 98% eliminación bacterias cariogénicas

PASTA DENTÍFRICA LACER

Lacer Pasta Dentífrica es una fórmula innovadora de acción multiprotección de dientes y encías para mantener la boca sana a diario. Gracias a su alto contenido en Flúor de liberación inmediata y su completa formulación con Cymenol, ayuda a mantener una boca sana y protegida.

Su completa composición proporciona acción protectora de dientes y encías con acción antisarro, antiplaca y anticaries, 5 veces más remineralizante y una acción antimicrobiana con alta capacidad de penetración en el biofilm oral que previene la formación de placa bacteriana y ayuda a prevenir la inflamación de las encías. Una fórmula completa para el cuidado de la boca.

Sin peligro de intolerancias. Indicada para para adultos y niños mayores de 12 años.

TAMBIÉN TEXTURA EN GEL

Gel dentífrico de textura fluida. Una textura para aquellas personas que prefieren un dentífrico fluido, en gel, conservando la eficaz formulación anticaries y la alta calidad de **Laboratorios Lacer**.

COLUTORIO LACER

Lacer Colutorio previene la aparición de placa bacteriana y limpia en profundidad. Previene la caries dental, refuerza el esmalte dental, fortalece los dientes, combate el mal aliento y protege eficazmente dientes y encías, dejando una agradable sensación de limpieza. Cymenol como agente antimicrobiano previene la inflamación de las encías.

La composición de **Lacer Colutorio** tiene poder antioxidante que reduce los radicales libres y favorece la salud gingival.

Fórmula completa multiprotección

- **Antisarro · Anticaries · Antiplaca**
- **Protege las encías**
- **Combate el mal aliento**
- **Antimicrobiano**
- **Antioxidante**
- **Remineralizante**

PRODUCTOS SIN GLUTEN



Composición, presentaciones y código nacional

PASTA DENTÍFRICA
Aqua, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Hydrated Silica, Glycerin, Magnesium Aluminum Silicate, PEG-8, Aroma, Xylitol, Sodium Lauryl Sulfate, Xanthan Gum, Sodium Fluoride, CI77891, Sodium Citrate, Sodium Gluconate; Sodium Saccharin, O-Cymen-5-ol, Citric Acid, Menthol, Limonene.

GEL DENTÍFRICO
Aqua, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Hydrated Silica, Glycerin, PEG-8, Sodium Monofluorophosphate, Xylitol, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Xanthan Gum, Urea, Sodium Hydroxide, Sucralose, Menthol, Sodium Gluconate, Methyl Salicylate, Vanillin, Limonene.

COLUTORIO
Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Xylitol, Hydroxyacetophenone, Sodium Citrate, Sodium Gluconate, Poloxamer 407, Aroma, O-Cymen-5-ol, Sodium Fluoride, Menthol, Sucralose, Citric Acid, Mentha Piperita Oil, Neohesperidin Dihydrochalcone, Vanillin, CI 14720, Limonene.

Pasta Dentífrica 125 ml
C.N. 391847.3
8 470003 918473

Pasta Dentífrica 75 ml
C.N. 391854.1
8 470003 918541

Colutorio 200 ml
C.N. 201368.1
8 470002 013681

Colutorio 500 ml
C.N. 205765.4
8 470002 057654

Pasta Dentífrica 200 ml
C.N. 163647.8
8 470001 636478

Pack Viaje 3 Pastas
C.N. 165113.6
8 470001 651136

Colutorio 1.000 ml
C.N. 162085.9
8 430340 050724

Colutorio 100 ml
C.N. 161122.2
8 470001 611222

Gel Dentífrico 125 ml
C.N. 174866.9
8 470001 748669

Pasta Dentífrica 50 ml
C.N. 391862.6
8 470003 918626

Lacer® Fresh

Siente el frescor en tu boca

Lacer Fresh Frescor Prolongado es una gama anticaries de uso diario idónea para mantener una boca sana y conseguir un aliento fresco.

Gracias a su fórmula avanzada, previene la aparición de caries y placa dental, protege el esmalte y las encías y enmascara el mal aliento, proporcionando una agradable e intensa sensación de frescor en la boca de efecto prolongado.

SALES DE FLÚOR

- **ACCIÓN ANTICARIES**
  + PROTECCIÓN DEL ESMALTE

Previene la caries dental, con capacidad protectora del esmalte dental frente al ácido.

CLORHIDRATO DE OCTENIDINA Y CLORURO DE ZINC

- **ACCIÓN ANTIPLACA Y PROTECCIÓN DE LAS ENCÍAS**

Previene la formación de placa dental y protege eficazmente dientes y encías, ayudando a mantener una buena salud bucodental.

- **ENMASCARA EL MAL ALIENTO**

Gracias a sus ingredientes activos, la fórmula **Lacer Fresh Frescor Prolongado** enmascara el mal aliento. Las sales de Zinc tienen la capacidad de combinarse con los compuestos volátiles, impidiendo que sean perceptibles al olfato.

MENTHA PIPERITA, EUCALIPTOL Y MENTOL

- **FRESCOR PROLONGADO**

Contiene aromas potenciadores del efecto frescor prolongado. Sabor a menta fresca persistente en boca que combina el frescor de la *Mentha piperita*, la intensidad duradera del mentol, y la persistencia en boca del eucaliptol.



- Agradable e intensa sensación de frescor prolongado
- Antiplaca y anticaries
- Protege las encías
- Aliento fresco

Composición, presentaciones y código nacional

GEL DENTÍFRICO
Diclorhidrato de Octenidina, Cloruro de Zinc, Monofluorofosfato Sódico (1.400ppm).

COLUTORIO
Diclorhidrato de Octenidina, Cloruro de Zinc, Fluoruro Sódico (225ppm).

SPRAY
Diclorhidrato de Octenidina, Cloruro de Zinc, Fluoruro Sódico (225ppm).

Gel Dentífrico 75 ml	Gel Dentífrico 125 ml	Colutorio 500 ml	Spray 15 ml
C.N. 217604.1	C.N. 168332.8	C.N. 342970.2	C.N. 184010.3
8 470002 176041	8 470001 683328	8 470003 429702	8 470001 840103

Lacer® Natur

A base de ingredientes de origen natural

Lacer **Natur** con extractos de origen natural vegetales, protege contra la caries y previene la placa dental, ayudando a mantener las encías y los dientes sanos.

Lacer **Natur** ha sido desarrollado teniendo en cuenta la salud de tu boca, y también el cuidado del medio ambiente. Por eso estamos comprometidos con la protección del planeta y trabajamos cada día para que los envases sean más sostenibles, con materiales reciclables.

Lacer **Natur**, con extractos naturales vegetales, protege contra la caries, previene la placa dental y ayuda a mantener una boca y unos dientes sanos.
Además Lacer Natur ofrece una higiene dental óptima sin dañar el esmalte, ni irritar encías y mucosas.

- **Protege dientes y encías**
- **Antiplaca · Anticaries**
- **Apto para veganos**
- **Con té verde y Provitamina B5**
- **Materiales reciclables**



CEPILLO
Mango natural de Bambú, antibacteriano y biodegradable.
Filamentos ECO de origen vegetal.
Estuche papel 100% reciclado.

with **NATURAL MINT**

Composición, presentaciones y código nacional

PASTA DENTÍFRICA
Aqua, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Hydrated Silica, Glycerin, Dicalcium Phosphate Dihydrate, Sodium Monofluorophosphate, Panthenol, Xylitol, Xanthan Gum, Mentha Spicata Herb Oil, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Phytate, Stevia Rebaudiana Leaf/Stem Extract, Menthol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Carvone, Limonene, Beta-Caryophyllene, Pinene.
Ion fluoruro: 1.400 ppm. Contiene sodium monofluorophosphate.

COLUTORIO
Aqua, Xylitol, Glycerin, Propanediol, Panthenol, Hydroxyacetophenone, Sodium Citrate, Glycolipids, Citric Acid, Sodium Phytate, Mentha Spicata Herb Oil, Sodium Benzoate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Carvone, Limonene, Beta-Caryophyllene, Pinene.

Lacer Natur
Pasta Dental 75 ml
C.N. 222165.9
8 470002 221659

Lacer Natur
Enjuague bucal 500 ml
C.N. 194484.9
8 470001 944849

Lacer Natur
Cepillo
C.N. 195317.9
8 470001 953179

Lacer® Blanc

Acción blanqueadora intensa protegiendo dientes y encías

EL EQUILIBRIO PERFECTO

Acción Blanqueadora Intensa

Las Sílicas de la nueva formulación de **LacerBlanc** arrastran eficazmente las manchas extrínsecas, devolviendo a los dientes su color natural, brillo y suavidad, sin dañar el esmalte dental.

Además, gracias a la Polivinilpirrolidona o PVP, crea una capa protectora o película que recubre los dientes, evitando la adhesión de nuevas manchas y ayudando a eliminar las ya existentes.

• BLANQUEAMIENTO *Blue optic*

LacerBlanc incorpora en su nueva pasta dentífrica el colorante azul **"Blue brilliant"** que proporciona a los dientes una apariencia más blanca con efecto inmediato* tras el cepillado dental.

Protección de dientes y encías

• PROTEGE LOS DIENTES
Anticaries · Antiplaca · Antisarro

El Ion Fluoruro (1.400 ppm) de la nueva composición de **LacerBlanc** fortalece el esmalte dental y previene la caries, la combinación de Cymenol y Zinc previene la formación de placa bacteriana y la acción combinada del Zinc y el Hexametafosfato sódico ayuda a eliminar y previene la formación de sarro.

• PROTEGE Y TONIFICA LAS ENCÍAS

El Cymenol es un potente agente antimicrobiano con una alta capacidad de penetración en el biofilm oral (placa bacteriana), disgregándolo y ejerciendo su actividad antimicrobiana desde las capas más profundas, contribuyendo a la salud gingival. A su vez, la Vitamina E ayuda a tonificar las encías y a mantenerlas en buen estado y su combinación con el Cymenol confiere un efecto antioxidante en la cavidad oral.

• PREVIENE LA SENSIBILIDAD DENTAL

La sal de potasio ayuda a controlar la sensibilidad dental causada por la exposición de la dentina a alimentos o bebidas frías, calientes, ácidas o dulces u otros estímulos externos.



- **Blanquea los dientes a diario sin dañar el esmalte dental**
- **92% de eficacia blanqueadora**
- **Limpieza y abrasividad en perfecto equilibrio**

**El efecto es temporal. Efecto óptico: "An In-Vitro Study to Compare the Non-Abrasive Whitening Efficacy of Six Toothpaste Formulations". Intertek (Nov'23)*

Composición, presentaciones y código nacional

PASTA DENTÍFRICA Sabor Menta
Hexametafosfato Sódico, Polivinilpirrolidona, Monofluorofosfato Sódico, Xilitol, Citrato Potásico, Citrato de Zinc, Vitamina E Acetato, Cymenol.

PASTA DENTÍFRICA Sabor Citrus
Hexametafosfato Sódico, Polivinilpirrolidona, Monofluorofosfato Sódico, Xilitol, Citrato Potásico, Citrato de Zinc, Vitamina C Fosfato Sódico, Ion Fluoruro.

COLUTORIOS
Hexametafosfato Sódico, Polivinilpirrolidona, Cloruro de Zinc, Ion Fluoruro.

Pasta Dentífrica sabor menta 75 ml
C.N. 169171.2

Pasta Dentífrica sabor menta 125 ml
C.N. 169172.9

Pasta Dentífrica sabor citrus 75 ml
C.N. 157654.5

Pasta Dentífrica sabor citrus 125 ml
C.N. 157655.2

Colutorio sabor menta 500 ml
C.N. 169170.5

Colutorio sabor citrus 500 ml
C.N. 163947.9

Lacer® Blanc

Blanqueamiento dental inmediato

LACER BLANC WHITE FLASH KIT DENTAL BLANQUEADOR

LacerBlanc White Flash es un kit de blanqueamiento dental, activado por luz, de fácil uso y de efecto inmediato tras la primera aplicación.

CLÍNICAMENTE TESTADO

NUEVA TECNOLOGÍA

LacerBlanc White Flash está desarrollado por una nueva tecnología compuesta por:

- Férula dental fotoluminiscente que se impregna de **partículas fotoluminiscentes** que aceleran el proceso de descomposición del activo blanqueador y que se carga con luz natural o artificial durante **5 minutos.**
- **Gel dental preparador** que prepara y acondiciona el diente para favorecer el activo blanqueador.
- **Un gel dental blanqueador** que contiene el activo blanqueador: el percarbonato sódico que se descompone en peróxido de hidrógeno (<0,1%), siendo realmente efectivo ya que está en contacto con el diente durante 15 minutos en condiciones óptimas.

LACER BLANC PINCEL DENTAL BLANQUEADOR

LacerBlanc Pincel Dental Blanqueador es un gel dental de acción blanqueadora a base de peróxido de hidrógeno, indicado para la eliminación de determinadas manchas del diente.

Su efecto blanqueador, consiste en eliminar las manchas adsorbidas en el diente, recuperando éste su color natural y brillo sin dañar el esmalte.

Es de fácil aplicación gracias a su punta en forma de pincel.





- **Kit de blanqueamiento dental clínicamente testado**
- **Blanqueamiento en solo una semana**
- **Cómodo, de fácil uso y de efecto inmediato tras 15 minutos de aplicación en el diente**
- **Activo blanqueador: Percarbonato sódico (se descompone en Peróxido de hidrógeno <0,1%)**
- **Contenido: 10 usos**

Presentaciones y código nacional

LacerBlanc White Flash
C.N. 193248.8
8 470001 932488

LacerBlanc Pincel Dental Blanqueador
C.N. 162572.7
8 470001 625724

Lacer® Aligner Ortodoncia

Para portadores de alineadores invisibles y otras ortodoncias

Lacer Aligner ha sido especialmente formulado y diseñado para cubrir las necesidades de los usuarios de ORTODONCIA INVISIBLE y otras ortodoncias.

Bajo el alineador, las bacterias crecen más rápido y el biofilm es más resistente. **Lacer Aligner** actúa directamente sobre este microentorno. Gracias a su contenido en Flúor de liberación inmediata, Cymenol, Octenidina, Vitamina E y un Cooling agent, consigue una acción completa.

PARA EL CUIDADO DE LA SALUD BUCODENTAL

Cuidado esencial diario

PASTA DENTÍFRICA Y COLUTORIO SIN COLORACIÓN: Protección de dientes y encías para portadores de alineadores invisibles y otras ortodoncias. Gracias a su formulación, repara y protege el esmalte dental, previene la caries, evita la formación de placa bacteriana y la acumulación de sarro. Protege y tonifica las encías por su efecto antioxidante. Proporciona una sensación de frescor prolongado.

Cuidado estés donde estés

SPRAY: Frescor prolongado para portadores de alineadores invisibles y otras ortodoncias. Modo de empleo: Aplicar 2 pulverizaciones en la ortodoncia antes de colocar en la boca.
SIN ENJUAGAR.

ESPUMA: Limpieza profunda y frescor para portadores de alineadores invisibles y otras ortodoncias. Con microburbujas de oxígeno activo, ayuda a mantener dientes y encías en buen estado y ayuda a prevenir las manchas. Modo de empleo: Aplicar 2 ó 3 pulsaciones en la ortodoncia antes de colocar en la boca. Expulsar el exceso de producto sobrante en la boca.
SIN ENJUAGAR.

PARA EL CUIDADO DE LA ORTODONCIA

TABLETAS DESINFECTANTES PARA ORTODONCIAS Y FÉRULAS: Con Nitradine. Elimina el 99,99% de bacterias.
Antiplaca · Actividad virucida y levuricida

PRODUCTOS SIN GLUTEN

NUEVO



- **Acción completa**
  - Anticaries
  - Antiplaca
  - Antisarro
  - Remineralizante
  - Antioxidante
  - Antimicrobiano
  - Frescor prolongado
- **Indicado para mayores de 12 años y adultos**
- **Sabor menta**

Composición, presentaciones y código nacional

PASTA DENTÍFRICA
Hydrogenated Starch Hydrolysate, Aqua, Hydrated Silica, Glycerin, Propylene Glycol, Xylitol Aroma, Xanthan Gum, Sodium Lauryl Sulfate, Menthol, Tocopheryl Acetate, Sodium Fluoride, Sodium Lauryl Sarcosinate, Menthyl Ehtylamido Oxalate, O-Cymen-5-ol, Sucralose, Sodium Gluconate, Potassium Acesulfame, Octenidine HCl, Anethole, Carvone, Mentha Viridis Leaf Oil, Limonene.

COLUTORIO
Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Xylitol, Tocopheryl Acetate, Aroma, Hydroxyacetophenone, Menthol, Sodium Fluoride, Sodium Gluconate, Menthyl Ethylamido Oxalate, O-Cymen-5-ol, Sucralose, Sodium Citrate, Potassium Acesulfame, Citric Acid, Octenidine HCl, Anethole, Carvone, Mentha Viridis, Leaf Oil, Limonene, Pinene.

SPRAY
Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Xylitol, Aroma,Tocopheryl Acetate, Menthol, Hydroxyacetophenone, Sodium Fluoride, Sodium Gluconate, Menthyl Ethylamido Oxalate, O-Cymen-5-ol, Sodium Citrate, Sucralose, Potassium Acesulfame, Citric Acid, Octenidine HCl, Anethole, Carvone, Mentha Viridis, Leaf Oil, Limonene, Pinene, Beta-Caryophylene.

Pasta Dentífrica sin coloración 75 ml
C.N. 222126.0
8 430340 066954

Pasta Dentífrica sin coloración 125 ml
C.N. 222127.7
8 430340 066961

Colutorio 500 ml
C.N. 222128.4
8 430340 066985

Tabletas desinfectantes 32 u.
C.N. 223247.1
8 430340 067432

Spray 30 ml
C.N. 222932.7
8 430340 067005

Espuma 50 ml
C.N. 222967.9
8 430340 067241

Cera Ortodoncia 7 barras
C.N. 223245.7
8 430340 067364

Cera Ortodoncia 14 barras
C.N. 223246.4
8 430340 067371

Gingi Lacer®

*Reduce el sangrado gingival en menos de 48 horas**

GingiLacer Encías Delicadas Ayuda a regenerar las encías y prevenir el sangrado gingival causado por encías delicadas y gingivitis.

La formulación del nuevo **GingiLacer Encías Delicadas** actúa de forma rápida y eficaz inhibiendo la actividad bacteriana, reduciendo la formación de placa dental, ayudando a: regenerarel tejido gingival, reducir la inflamación y el sangrado gingival.

** Estudio clínico controlado y aleatorizado en 60 sujetos (18-65 años) con gingivitis grado II (Löe y Silness) e índice de placa > 2 (Turesky)"*

INHIBE LA ACTIVIDAD BACTERIANA

La acción sinérgica del Cymenol y el Cloruro de Zinc, reforzada por los excipientes de su formulación, reduce rápida y clínicamente la formación de placa dental, principal causa de la gingivitis. Además, el ion fluoruro previene la aparición de caries.

PREVIENE EL SANGRADO GINGIVAL

La capacidad astringente del Cloruro de Zinc reduce el sangrado gingival originado por el cepillado atenuando el proceso congestivo y mejorando el estado general de las encías.

AYUDA A REDUCIR LA INFLAMACIÓN

El Glicirrizato potásico ayuda a aliviar las molestias y contribuye a restaurar el confort y bienestar de las encías reduciendo eficazmente los signos de inflamación gingival (enrojecimiento y sangrado).

AYUDA A LA REGENERACIÓN GINGIVAL

El Ácido hialurónico ayuda a la regeneración y la epitelización de las encías. **GingiLacer Encías Delicadas** mejora el estado de las encías inflamadas y enrojecidas.



- **Regenera el tejido gingival, mejorando el estado de las encías inflamadas y enrojecidas**
- **Reducción del sangrado gingival en menos de 48 horas**
- **Ayuda a reducir la inflamación**
- **Alta eficacia antiplaca de la combinación Cymenol/Zinc**
- **Sin tinción, adecuado para uso diario**
- **Tratamiento idóneo para pacientes diabéticos**

PRODUCTOS SIN GLUTEN

Composición, presentaciones y código nacional

PASTA DENTÍFRICA

Cymenol	0,1%
Cloruro de Zinc	0,6%
Glicirrizato Potásico	0,2%
Fluoruro Sódico	0,31 %
Hialuronato Sódico	0,2 %

Ion fluoruro: 1.400 ppm
Bajo índice de abrasividad.

COLUTORIO

Cymenol	0,1%
Cloruro de Zinc	0,1%
Glicirrizato Potásico	0,05%
Fluoruro Sódico	0,05%
Hialuronato Sódico	0,025 %

Ion fluoruro: 225 ppm

Pasta Dentífrica 75 ml
C.N. 257337.6
8 430340 069207

Pasta Dentífrica 125 ml
C.N. 267872.9
8 430340 069214

Pasta Dentífrica 200 ml
C.N. 182826.2
8 430340 069238

Colutorio 200 ml
C.N. 263657.6
8 430340 069467

Colutorio 500 ml
C.N. 263665.1
8 430340 069474

Colutorio 1.000 ml
C.N. 163308.8
8 430340 069481

Sensi Lacer®

Alivio rápido de la sensibilidad dental

SensiLacer reduce la sensibilidad dental de forma rápida y duradera, protegiendo y fortaleciendo la dentina, lo cual potencia su acción desensibilizante.

• Nitrato potásico: uno de los principios activos más eficaces para disminuir la sensibilidad dental.
• Flúor: su acción remineralizadora potencia el efecto desensibilizante, contribuyendo a la prevención de la sensibilidad dental y protegiendo contra la caries.

• Agente mineral obliterante o PVM/MA: ejerce una obliteración rápida y duradera de la superficie dentinal y sus túbulos, reforzando la dentina, efecto que refuerza su eficacia, protegiendo al diente frente a los estímulos causantes de la sensibilidad dental.

SensiLacer Gel Bioadhesivo: Clínicamente se ha demostrado que con la primera aplicación de **SensiLacer Gel Bioadhesivo** hay una reducción del 47% de la sensación dolorosa y, al cabo de una semana, una reducción del 94% de la misma.

SensiLacer Pasta Dentífrica y SensiLacer Gel Dentífrico: dentífricos de acción desensibilizante rápida y prolongada, que disminuyen la sensibilidad de los dientes sensibles frente al frío, calor, dulces u otros estímulos. Por su bajo índice de abrasividad, estos dentífricos son idóneos para el cuidado de los dientes sensibles y como dentífricos de uso diario para personas propensas a presentar sensibilidad dental.

PRODUCTOS SIN GLUTEN

- **Reduce la sensibilidad dental de forma rápida y duradera**
- **Oclusión de los túbulos dentinarios**
- **Reducción del impulso nervioso**
- **Acción remineralizante del esmalte**



Composición, presentaciones y código nacional

PASTA DENTÍFRICA

Nitrato Potásico	5%
Agente Mineral Obliterante	9%
Monofluorofosfato Sódico	1,89%
Xilitol	1%
Ion Fluoruro	2.500 ppm

GEL BIOADHESIVO

Nitrato Potásico	10%
Agente Mineral Obliterante	7,5%
Monofluorofosfato Sódico	1,89%
Ion Fluoruro	2.500 ppm

GEL DENTÍFRICO

Nitrato Potásico	5%
Agente Mineral Obliterante	9%
Monofluorofosfato Sódico	1,89%
Xilitol	1%
Ion Fluoruro	2.500 ppm

COLUTORIO

Nitrato Potásico	5%
Fluoruro Sódico	0,31%
Xilitol	1%
Ion Fluoruro	1.400 ppm
Copolímero PVM/MA Agente oclusivo de los túbulos dentinarios	

Gel Dentífrico 125 ml
C.N.: 174984.0
8 470001 749840

Gel Bioadhesivo 50 ml
C.N.: 174982.6
8 470001 749826

Colutorio 500 ml
C.N. 167098.4
8 470001 670984

Pasta Dentífrica 75 ml
C.N. 206359.4
8 470002 063594

Pasta Dentífrica 125 ml
C.N. 208355.4
8 470002 083554

Lacer® Oros

Protege tu boca con la mejor protección bucodental integral

Lacer Oros Acción Integral está desarrollado para una protección bucodental integral de dientes y encías, al tener una triple acción anticaries, prevenir el sangrado gingival y desensibilizante dental.

FÓRMULA AVANZADA

Desarrollada para proteger la salud de dientes y encías:

- Alta capacidad de penetración en el biofilm bucodental.
- Ayuda a reducir bacterias patógenas manteniendo viabilidad de microbiota sana propia (estudio clínico interno).

LIMPIEZA SUAVE Y EFICAZ

Dentífrico con espumantes suaves y con óptimo poder de limpieza y arrastre para realizar la correcta limpieza dental diaria.

SISTEMA ANTIPLACA-ANTISÉPTICO

Lacer Oros Acción Integral gracias a la combinación de sus ingredientes activos presenta un potente mecanismo de acción antibiofilm, tanto en penetración como eliminación, que le proporciona unas interesantes propiedades antisépticas y antioxidantes avaladas clínicamente en su uso diario.

Este sistema muestra una eficacia significativa en los principales parámetros gingivales y un potente efecto astringente que ayuda a reducir el sangrado gingival.

SISTEMA ANTIINFLAMACIÓN

Lacer Oros Acción Integral contiene ingredientes activos que ayudan a proteger y tonificar las encías. Así mismo presenta unas interesantes propiedades antinflamatorias y antioxidantes.

SISTEMA ANTICARIES

Debida a la acción de las sales de flúor con un conocido efecto remineralizante del esmalte dental.

ALIVIO SENSIBILIDAD DENTAL

La presencia de sales de potasio genera un eficaz alivio del dolor causado por la hipersensibilidad dentinaria debido al bloqueo del estímulo doloroso neural.

PRODUCTOS SIN GLUTEN



- **Previene el sangrado de encías**
- **Reduce la sensibilidad dental**
- **Protege contra la caries**

Composición, presentaciones y código nacional

PASTA DENTÍFRICA

Cymenol	0,1%
Cloruro de Zinc	0,6%
Monofluorofosfato Sódico	1,895%
Glicirrizato Potásico	0,2%
Nitrato Potásico	5%
Ion Fluoruro	2.500 ppm

COLUTORIO

Cymenol	0,1%
Cloruro de Zinc	0,1%
Fluoruro Sódico	0,2%
Glicirrizato Potásico	0,05%
Nitrato Potásico	1%
Ion fluoruro	900 ppm

Pasta Dentífrica 75 ml
C.N. 396556.9
8 470003 965569

Pasta Dentífrica 125 ml
C.N. 309443.6
8 470003 094436

Colutorio 500 ml
C.N. 260083.6
8 430340 052926

Colutorio 1.000 ml
C.N. 195096.3
8 470001 950963

Pasta Dentífrica 200 ml
C.N. 192931.0
8 470001 929310

Gel dental

Lacer® júnior & infantil

Cuidado de la salud bucodental de los más jóvenes

Lacer se renueva en el cuidado de la salud bucodental infantil. Actualizamos y modernizamos todas las fórmulas, haciéndolas más eficaces y sostenibles para el medio ambiente.

El **Gel dental Lacer Infantil previene la caries** de forma eficaz desde la aparición del primer diente, con 1.000 ppm de ion fluoruro, la dosis adecuada para prevenir la caries en niños y niñas de 6 meses a 6 años, siguiendo la recomendación de la SEOP y la IAPD. Agradable sabor a fresa.

El **Gel dental Lacer Júnior previene la caries** de forma eficaz, gracias a sus 1.400ppm de ion fluoruro y **protege las encías** de los niños y niñas a partir de 6 años, gracias al Pantenol, que refuerza la protección de las encías. Dos agradables sabores: fresa y menta.

Ambos **GELES remineralizan el esmalte dental** gracias a la combinación de Flúor + Calcio, actuando como un **escudo protector en el diente y ofreciendo una mayor protección frente a la caries** dental en toda la gama.

Están formulados:

- Sin GLUTEN
- Sin LACTOSA
- Sin CONSERVANTES
- Con EDULCORANTES no CARIOGÉNICOS

El **Cepillo dental Lacer Infantil** ha sido especialmente diseñado para niños de 2 a 6 años de edad, tanto por sus dimensiones como por su cabezal pequeño y cerdas suaves que al combinarlo con el **Gel dental Lacer Infantil**, le garantiza al niño una correcta higiene bucal adecuada a esta franja de edad.

El **Cepillo dental Lacer Júnior** ha sido diseñado, tanto por sus dimensiones como por su forma y cabezal, con el objetivo de garantizar la correcta higiene bucal de niños mayores de 6 años.

Se recomienda el cepillado dental tres veces al día, después de cada comida y sobre todo por la noche, antes de acostarse.











- **Flúor + calcio: Mayor protección anticaries**
- **Dosis adecuada de flúor para cada franja de edad**
- **Gama Junior: Con Pantenol para reforzar la protección de las encías**
- **Excelente sabor a fresa y menta**
- **No contiene conservantes**
- **Bajo índice de abrasividad**

PRODUCTOS SIN GLUTEN

Composición, presentaciones y código nacional

GEL DENTÍFRICO LACER JÚNIOR
Monofluorofosfato sódico, Glicerofosfato cálcico, Xilitol, Pantenol, Ion fluoruro (1.400 ppm)

GEL DENTÍFRICO LACER INFANTIL
Monofluorofosfato sódico, Glicerofosfato cálcico, Xilitol, Ion fluoruro (1.000 ppm)

Lacer Júnior fresa Gel Dentífrico 75 ml
C.N. 331978.2
8 470003 319782

Lacer Júnior menta Gel Dentífrico 75 ml
C.N. 155588.5
8 470001 555885

Gel Infantil 75 ml
C.N. 184562.7
8 470001 845627

Cepillo Dental Lacer Infantil
C.N. 162597.7
8 470001 625977

Cepillo Dental Lacer Júnior con ventosa
C.N. 266651.1
8 470002 666511

Cepillo Dental Lacer Júnior
C.N. 338574.9
8 470003 385749

FLÚOR Lacer® júnior

Cuidado de la salud bucodental de los más jóvenes

- Dosis de flúor adecuada para uso diario (225ppm) y para uso semanal (900ppm).
- La combinación del flúor + calcio, actúa como escudo protector en el diente, ayudando a mantener en buen estado el esmalte dental.
- Con Pantenol, que protege las encías.
- Con Xilitol, edulcorante no cariogénico que mejora la acción anticaries.
- Sin Gluten y sin Alcohol.

Flúor Lacer Júnior se renueva en el cuidado de la salud bucodental infantil con nuevas fórmulas mejoradas, nuevas indicaciones y nuevos diseños en toda la gama.

Flúor Lacer Júnior es un enjuague bucal, de uso diario o semanal, que **previene la caries** de forma eficaz y **protege las encías de los más jóvenes.**

- **Flúor + calcio: Mayor protección anticaries**
- **Refuerza la protección de las encías gracias al Pantenol**
- **Excelente sabor a fresa y menta**



PRODUCTOS SIN GLUTEN

Composición, presentaciones y código nacional

COLUTORIO DIARIO
Monofluorofosfato Sódico, Glicerofosfato cálcico, Xilitol, Pantenol, Excipientes c.s.

Ion Fluoruro: 225 ppm

Enjuague bucal uso diario sabor fresa 500 ml
C.N. 238576.4
8 470002 385764

Enjuague bucal uso diario sabor menta 500 ml
C.N. 212209.3
8 470002 122093

COLUTORIO SEMANAL
Monofluorofosfato Sódico, Glicerofosfato cálcico, Xilitol, Pantenol, Excipientes c.s.

Ion Fluoruro: 900 ppm

Enjuague bucal uso diario sabor fresa 100 ml
C.N. 238592.4
8 470002 385924

Clorhexidina Lacer®

El antiséptico de elección con sabor agradable

Clorhexidina Lacer es un eficaz antiséptico de amplio espectro frente a los microorganismos de la placa bacteriana y con sabor agradable. Su acción es rápida y mantiene su efecto durante un largo período de tiempo, evitando la posible recolonización bacteriana de la cavidad oral. La **Clorhexidina Lacer** se une fuertemente a diversas superficies bucodentales formando así un sistema de liberación sostenida.

La **Clorhexidina Lacer** actúa a distintos niveles: elimina la estructura de la placa bacteriana existente, inhibe la adhesión de proteínas muco-salivares, inhibe la formación de nueva placa bacteriana y destruye los microorganismos responsables de la formación de la placa dental.

Está indicado como coadyuvante en el tratamiento de gingivitis y periodontitis. También es eficaz como terapia de mantenimiento en el tratamiento periodontal y preimplantario, en cirugía periodontal (pre y post operatorio), en implantología, en profilaxis dental de pacientes irradiados (caries rampante) y en gerodontología.

La nueva fórmula de **colutorio Clorhexidina Lacer 0,12%** incorpora un excipiente mucoadhesivo que prolonga su permanencia en boca, lo que junto con la presencia del Cymenol, incrementa su eficacia antimicrobiana.

El **gel bioadhesivo Clorhexidina Lacer** incorpora Cymenol en su formulación. Esta combinación penetra mejor en el biofilm incrementando su actividad antiséptica local. Además presenta una bioadhesividad mejorada que facilita la aplicación y adherencia del producto en la zona a tratar. Este efecto se mantiene de forma prolongada y sostenida lo que potencia el efecto antimicrobiano del producto.



- **La Clorhexidina es un eficaz antiséptico de amplio espectro frente a los microorganismos de la placa bacteriana**
- **Sabor agradable que favorece el cumplimiento del tratamiento completo por parte del paciente**

Composición, presentaciones y código nacional

PASTA DENTÍFRICA

Digluconato de Clorhexidina	0,12%
Xilitol	1%
Vitamina E Acetato	0,5%
Provitamina B5 (Pantenol)	0,5%

COLUTORIO 0,12%

Digluconato de Clorhexidina	0,12%
Cymenol	0,1%
Xilitol	1%

COLUTORIO 0,2%

Digluconato de Clorhexidina	0,2%
Xilitol	1%

GEL BIOADHESIVO

Digluconato de Clorhexidina	0,2%
Cymenol	0,1%

SPRAY 0,12%

Digluconato de Clorhexidina	0,12%
Cymenol	0,1%
Xilitol	1%

SPRAY 0,2%

Digluconato de Clorhexidina	0,2%
Xilitol	1%

Pasta Dentífrica 75 ml
C.N. 189308.6
8 470001 893086

Gel Bioadhesivo 50 ml
C.N. 354605.8
8 470003 546058

Spray 0,12% 30 ml
C.N. 247742.1
8 430340 061942

Spray 0,2% 30 ml
C.N. 216547.2
8 470002 165472

Colutorio 0,20% 500 ml
C.N. 198288.9
8 470001 982889

Colutorio 0,12% 200 ml
C.N. 385641.6
8 470003 856416

Colutorio 0,12% 500 ml
C.N. 385666.9
8 430340 059963

Lacer® MUCOREPAIR

*Facilita la cicatrización de las mucosas orales potenciada por su capacidad antimicrobiana**

La gama completa **Lacer Mucorepair** restablece la salud de las mucosas orales, favoreciendo la cicatrización y ayudando a reducir la inflamación potenciado por su capacidad antimicrobiana*.

Lacer Mucorepair tiene la composición idónea para ayudar en la regeneración de los tejidos orales, ayudando a reducir la inflamación y favoreciendo la cicatrización de los tejidos orales (periodontales y mucosas) potenciado por su capacidad antimicrobiana, acelerando así la recuperación de la mucosa oral dañada tras:

- Implantes.
- Biopsias.
- Post cirugía odontológica.
- Lesiones de la mucosa oral causadas por traumatismos.
- Rozaduras provocadas por aparatos de ortodoncia y prótesis dentales.

COLUTORIO

Lacer Mucorepair Colutorio está desarrollado para ayudar en la regeneración y favorecer la cicatrización de los tejidos orales (periodontales y mucosas) tras sufrir una agresión que afecta a una gran superficie por cirugía oral o rozaduras provocadas por aparatos de ortodoncia y prótesis dentales.

GEL TÓPICO

Lacer Mucorepair Gel Tópico forma una película alrededor del área dañada, protegiéndola del medio externo y ayudando en su conjunto a la correcta y rápida recuperación de la mucosa oral dañada.



- **Restablece la salud de las mucosas orales, favoreciendo la cicatrización y ayudando a reducir la inflamación**
- **Indicado en extracciones generales quirúrgicas, implantes, biopsias y cualquier post cirugía odontológica**

** Para aplicar en tejidos orales tras cirugía o molestias causadas por aparatos y prótesis dentales.*

Composición, presentaciones y código nacional

GEL TÓPICO	
Asiaticósido	0,3%
Ácido Hialurónico	0,2%
Hialuronato Sódico	0,1%
Enoxolona	0,2%
Cymenol	0,1%

COLUTORIO	
Asiaticósido	0,05%
Ácido Hialurónico	0,11%
Hialuronato Sódico	0,1%
Enoxolona	0,057%
Cymenol	0,1%

Lacer Mucorepair Colutorio 200 ml
C.N. 218572.2
8 470002 185722

Lacer Mucorepair Gel Tópico 30 ml
C.N. 184834.5
8 470001 848345

Xero Lacer®

¿Boca seca? Alivio inmediato de la sequedad oral

XeroLacer está especialmente desarrollado para el cuidado de la boca seca (Xerostomía). Su completa formulación calma la sensación de sequedad oral, refresca la boca, remineraliza el esmalte y refuerza las encías, previniendo la aparición de alteraciones bucodentales ocasionadas por la disminución de saliva.

EQUILIBRANTE SALIVAL

Los componentes activos de la fórmula actúan como un regulador salival que compensa el déficit de sales minerales que contiene la saliva y estimula la secreción de la misma, favoreciendo el equilibrio del flujo salival.

PROTEGE FRENTE A LAS CARIES Y REMINERALIZA EL ESMALTE

El aporte de Flúor refuerza el esmalte dental y proporciona una eficaz prevención de la caries dental. Su formulación cuenta con ingredientes que potencian la acción cariostática (anticaries) y remineralizadora del esmalte.

PREVIENE LA INFLAMACIÓN Y EL SANGRADO GINGIVAL

La eficaz acción antimicrobiana del Cymenol reduce la formación de placa dental de forma prolongada y disminuye la inflamación de los tejidos gingivales, previniendo la aparición de gingivitis y sangrado gingival. Contiene vitaminas que facilitan la regeneración epitelial del tejido gingival y protegen las encías frente a la agresión de la placa dental. Además, contiene Aloe vera, cuya acción sinérgica de enzimas, aminoácidos, minerales y vitaminas restablece la mucosa gingival, y Glicirrizato potásico que previene la irritación.

NEUTRALIZA EL MAL ALIENTO Y EL MAL SABOR DE BOCA

Reequilibra la flora bacteriana con lo que se recupera la eficaz protección de la saliva frente a las bacterias causantes de mal aliento y mal sabor de boca. Además, **XeroLacer Colutorio** está formulado sin alcohol y con un excipiente muy suave, adecuado incluso para el uso diario de personas con una mucosa oral muy delicada.

XeroLacer Gel Tópico está indicado para reforzar la acción de hidratación bucal y prolongarla en el tiempo.

PRODUCTOS SIN GLUTEN

NUEVO



- **Equilibrante salival**
- **Protege frente a las caries, remineraliza el esmalte**
- **Previene el sangrado y la inflamación gingival**
- **Neutraliza el mal aliento y el mal sabor de boca**

Composición, presentaciones y código nacional

PASTA DENTÍFRICA

Cymenol	0,1%
Glicirrizato Potásico	0,15%
Monofluorofosfato Sódico	0,8%
Fluoruro Sódico	0,32%
Vitamina E Acetato	0,2%
Excipiente para Xerostomia a base de sales minerales, con vitamina y Aloe Vera	
Ion Fluoruro	2.500 ppm

COLUTORIO

Cymenol	0,1%
Fluoruro Sódico	0,1%
Monofluorofosfato Sódico	0,72%
Glicirrizato Potásico	0,05%
Vitamina E Acetato	0,2%
Excipiente para Xerostomia a base de sales minerales, con vitamina y Aloe Vera	
Ion Fluoruro	1.400 ppm

GEL TÓPICO

Cymenol	0,1%
Fluoruro Sódico	0,064%
Monofluorofosfato Sódico	0,16%
Glicirrizato Potásico	0,1%
Vitamina E Acetato	0,2%
Excipiente para Xerostomia a base de sales minerales, con vitaminas y Aloe Vera	
Ion Fluoruro	500 ppm

SPRAY

Cymenol	0,1%
Fluoruro Sódico	0,1%
Monofluorofosfato Sódico	0,72%
Glicirrizato Potásico	0,05%
Vitamina E Acetato	0,2%
Excipiente para Xerostomia a base de sales minerales, con vitaminas y Aloe Vera	
Ion Fluoruro	1.400 ppm

COMPRIMIDOS

Xilitol	58,294%
Ácido Málico	3,847%
Fluoruro Sódico	0,073%
Ion Fluoruro	330 ppm

Pasta Dentífrica 75 ml
C.N. 355834.1

Pasta Dentífrica 125 ml
C.N. 356345.1

Colutorio 500 ml
C.N. 373100.3

Gel Tópico 50 ml
C.N. 150614.6

Spray 30 ml
C.N. 372706.8

Comprimidos 60u.
C.N. 221817.8

Lacer pro

Fijación y limpieza de prótesis dentales removibles

LacerPro Forte Crema Adhesiva

24 HORAS DE FIJACIÓN SEGURA Y CONFORTABLE*

LacerPro Forte es una crema adhesiva que proporciona una fijación rápida y segura de las dentaduras postizas.

Su fórmula permite una fijación segura y confortable durante todo el día*.

Una vez aplicada la crema, y colocada la dentadura, ésta reacciona con la saliva, creando un cojín entre la prótesis y las encías, previniendo así la aparición de irritaciones en las encías.

LacerPro Forte permite la ingesta de cualquier comida o bebida. No altera el sabor de los alimentos. Crea una capa protectora que evita la entrada de alimentos entre la dentadura y la encía.

LacerPro Forte proporciona una fijación segura y confortable durante 24 horas* después de su aplicación.

LacerPro Forte forma un cojín entre la dentadura postiza y las encías, dando una gran sensación de confort y evitando la entrada de alimentos.

Ventajas:

- Sin zinc.
- Fácil aplicación.
- Fuerte fijación.

LacerPro Limpiadores

LIMPIEZA EN SÓLO 3 MINUTOS CON OXÍGENO ACTIVO

En tan sólo 3 minutos, el oxígeno activo generado limpia de forma intensa la prótesis dental, llegando incluso a aquellas zonas más difíciles de limpiar.

Otras importantes acciones de **LacerPro Limpiadores** son:

- Elimina las manchas de café, té y tabaco.
- Elimina los residuos de alimentos, previniendo la aparición de irritaciones en las encías.
- Previene la formación de sarro.
- Elimina el mal aliento ocasionado por los residuos acumulados en la prótesis.
- Deja una agradable sensación de frescor.

** Hasta 24 horas de fijación en dentaduras superiores.*

La gama más completa para prótesis dentales removibles



Presentaciones y código nacional

LacerPro
Limpiadores 64 u.
C.N. 163591.4

LacerPro
Limpiadores 32 u.
C.N. 153533.7

LacerPro Forte
Crema Fijadora 40 g
C.N. 183747.9

LacerPro Forte
Crema Fijadora 70 g
C.N. 183748.6

Lacer®
Cepillos dentales

Para un cepillado dental exigente y responsable

Los filamentos de alta calidad de los **nuevos cepillos dentales Lacer** garantizan el correcto arrastre de la placa dental, protegiendo dientes y encías.

AMPLIA GAMA PARA CADA NECESIDAD

Es importante escoger el cepillo dental que más se ajuste a las necesidades de higiene bucal de cada persona. Por eso **Lacer** dispone de una amplia variedad de cepillos tanto para uso diario como para usos específicos:

• CEPILLO DENTAL LACER FUERTE
Para personas que buscan una mayor sensación en el cepillado y no sufren o padecen sensibilidad dental ni problemas de encías.
FILAMENTOS DE 0,009" de diámetro.

• CEPILLO DENTAL LACER MEDIO
Para una completa higiene bucal diaria.
FILAMENTOS DE 0,008" de diámetro.

• CEPILLO DENTAL LACER SUAVE
Para una higiene bucal diaria en casos de dientes y encías sensibles.
FILAMENTOS EXTERNOS DE 0,006" de diámetro.
FILAMENTOS INTERNOS DE 0,007" de diámetro.

• CEPILLO DENTAL LACER EXTRASUAVE
Para una higiene bucal en casos de hiperestesia dental (sensibilidad dental) y/o con encías muy delicadas.
FILAMENTOS EXTERNOS DE 0,005" de diámetro.
FILAMENTOS INTERNOS DE 0,004" de diámetro.

• CEPILLO DENTAL LACERBLANC
El cepillo **LacerBlanc** está especialmente diseñado para una higiene bucal que favorece la eliminación de las manchas dentales extrínsecas.
FILAMENTOS EMBOSSED TYNEX.

• CEPILLO DENTAL QUIRÚRGICO
Cepillo dental con filamentos extremadamente suaves para la higiene bucal tras haber sufrido una intervención quirúrgica en la cavidad bucal.
FILAMENTOS DE 0,003" de diámetro.

• CEPILLO DENTAL ORTODONCIA
Para una higiene bucal diaria en portadores de ortodoncia. Su corte en forma de "V" permite un completo arrastre de la placa dental a la vez que limpia eficazmente los restos de alimentos depositados en los brackets, bandas y alambres.
FILAMENTOS EXTERNOS DE 0,007" de diámetro.
FILAMENTOS INTERNOS DE 0,008" de diámetro.

• CEPILLO DENTAL GINGILACER
El cepillo **GingiLacer** está especialmente diseñado para una limpieza muy suave y completa. Arrastra la placa dental y limpia eficazmente el espacio interdental y subgingival, cuidando las encías.
Sus filamentos PBT microfinos y flexibles arrastran la placa dental y limpian el espacio interdental y subgingival, cuidan las encías y previenen su irritación.
MONOFILAMENTOS PBT.

• LIMPIADOR LINGUAL LACER
En la lengua se depositan la mayoría de bacterias que causan el mal olor. Es muy importante limpiarla diariamente para poder completar al higiente bucal y ayudar a tener un buen aliento.





- **Filamentos de alta calidad que garantizan el correcto arrastre de la placa dental, protegiendo dientes y encías**
- **Cabezal que facilita el cepillado en las zonas de difícil acceso**
- **Capuchón protector para evitar contaminación externa**
- **Diseño más sostenible: Capùchón 100% reciclable y estuche de cartón reciclado**
- **Más colores de cepillos en toda la gama**

Presentaciones y código nacional

Cepillo Dental Fuerte
C.N. 162834.3
8 470001 628343

Cepillo Dental Medio
C.N. 162974.6
8 470001 629746

Cepillo Dental Suave
C.N. 162982.1
8 470001 629821

Cepillo Dental Extrasuave
C.N. 162990.6
8 470001 629906

Cepillo Dental LacerBlanc
C.N. 153937.3
8 470001 539373

Cepillo Dental Quirúrgico
C.N. 163006.3
8 470001 630063

Cepillo Dental Ortodoncia
C.N. 333583.6
8 470003 335836

Cepillo Dental GingiLacer
C.N. 164407.7
8 470001 644077

Cepillo Dental de Viaje
C.N. 164799.3
8 470001 647993

Limpiador Lingual Lacer
C.N. 184839.0
8 470001 848390

Lacer®

Cepillos dentales
CABEZAL PEQUEÑO

Una pequeña gran idea

El cabezal pequeño desarrollado por **Laboratorios Lacer** consigue una mayor precisión en la limpieza dental, llegando con comodidad a zonas de difícil acceso.

Además, su innovador diseño en forma de punta de diamante facilita un cepillado cómodo y eficaz, y su forma redondeada evita rozaduras y previene posibles lesiones en las encías y la mucosa oral.

Está especialmente indicado para ayudar a:

- **Mayor precisión en la limpieza bucal**
- **Limpieza en las zonas posteriores de la boca**
- **Limpieza de arcadas dentarias pequeñas o con limitación de apertura bucal**
- **Limpieza en personas con malposición dental**
- **Limpieza de las piezas en proceso de erupción**
- **Niños que pasan de un cepillo Junior a uno de adulto**

DISPONIBLE EN 2 MODELOS

• CEPILLO DENTAL CABEZAL PEQUEÑO LACER MEDIO

Con **Filamentos Tynex** que arrastran eficazmente la placa dental, cuidando dientes y encías gracias a sus puntas pulidas y redondeadas.

• CEPILLO DENTAL CABEZAL PEQUEÑO GINGILACER

Con **Filamentos PBT** microfinos y flexibles, que eliminan la placa dental del espacio interdental y supragingival, cuida las encías y previene su inflamación.





MÁXIMA PRECISIÓN

Presentaciones y código nacional

Cepillo Dental Medio
C.N. 168558.2

8 470001 685582

Cepillo Dental GingiLacer
C.N. 168560.5

8 470001 685605

Lacer®

Cepillos dentales MINI colors

El color que va contigo

Cepillos que siguen la premisa de **Lacer** de ofrecer las mejores prestaciones y la máxima calidad, ahora también con una amplia variedad de colores diferentes con los filamentos del mismo color que el mango.

- **FILAMENTOS**

Con puntas pulidas y redondeadas con extremos texturizados que ayudan a proteger dientes y encías.

- **CABEZAL**

De tamaño reducido y en forma de diamante que permite la limpieza en zonas de difícil acceso.

- **MANGO**

De tamaño reducido que facilita llevarlo en cualquier lugar.

DISPONIBLE EN DOS MODELOS

- Modelo MEDIO con filamentos de 0,008" de diámetro.
- Modelo SUAVE con filamentos de 0,006" de diámetro.



6 colores

Presentaciones y código nacional

Cepillo Dental Lacer MINI Medio (6 colores)
C.N. 183819.3
8 470001 838193

Cepillo Dental Lacer MINI Suave (6 colores)
C.N. 183818.6
8 470001 838186

Lacer Hidro®
Irrigador bucal

La nueva generación de irrigadores bucales

Los irrigadores bucales **Lacer Hidro Advanced** y **Lacer Hidro Inalámbrico Portátil** son el complemento perfecto a un buen cepillado dental. Sus impulsos de agua a presión favorecen la limpieza en profundidad en las zonas de difícil acceso y la zona subgingival, ayudando a reducir el biofilm dental.



LACER HIDRO IRRIGADOR BUCAL ADVANCED

La eficacia del irrigador bucal **Lacer Hidro Advanced** permite una completa limpieza dental e interdental en el hogar. Sus 10 niveles de presión crean una experiencia personalizada; sus configuraciones más bajas son perfectas para la limpieza de bolsas periodontales y las más altas para una limpieza interdental de alta potencia.

• DEPÓSITO DE AGUA DE 600 ml
Para una limpieza prolongada y completa de toda la boca.

• 10 NIVELES DE PRESIÓN Y 2 MODOS DE USO

• 4 RECAMBIOS INCLUÍDOS
Indicado para bolsas periodontales, zonas furcales.

• LIMPIADOR LINGUAL
Irrigador normal, Cepillo de Ortodoncia, Limpiador lingual, Limpiador subgingival.



COLORES DISPONIBLES:

LACER HIDRO IRRIGADOR BUCAL INALÁMBRICO PORTÁTIL

Gracias a su diseño ergonómico, su tamaño reducido de fácil transporte y su facilidad de llenado y manejo, el irrigador bucal **Lacer Hidro Inalámbrico Portátil** facilita una limpieza interdental más fácil, eficaz y rápida que el hilo dental.

• 4 MODOS DE LIMPIEZA
Normal, suave, masajeador de encías y personalizable.

• 7 NIVELES DE PRESIÓN

• DEPÓSITO DE AGUA DESMONTABLE DE 200 ml
Para facilitar su llenado y limpieza.

• 2 RECAMBIOS INCLUÍDOS

• DISEÑO ERGONÓMICO, LIGERO Y FÁCIL DE TRANSPORTAR

• TAMAÑO COMPACTO
Ocupa el mínimo espacio posibe en el baño.



- **Máximo nivel de higiene bucal**
- **Especialmente indicado para aparatos de ortodoncia, implantes, puentes, coronas, bolsas periodontales y fundas**

Presentaciones y código nacional

Lacer Hidro Irrigador Bucal Advanced (Blanco/Negro)	Lacer Hidro Irrigador Bucal Inalámbrico Portátil	Pack Recambio Lacer Hidro
C.N. 167891.1	C.N. 212620.6	C.N. 212622.0
8 470002 126190	8 470002 126206	8 470002 126220

Lacer® Interdentales

Porque todos los espacios son importantes

La gama **Lacer Cepillos Interdentales** ha sido especialmente diseñada para aportar una higiene eficaz de los espacios interdentales. Permiten eliminar la placa bacteriana en los espacios interdentales y en los espacios de difícil acceso, previniendo la aparición de caries, protegiendo las encías y evitando problemas periodontales, manteniendo unas encías sanas.

- **Mango bimaterial más ergonómico y antideslizante**
- **Un cepillo interdental para cada necesidad**
- **Alambre de acero quirúrgico recubierto de poliuretano**
- **Capuchón protector para cada cepillo**
- **5 medidas diferentes**
- **2 modelos: Lacer Interdental Recto y Lacer Interdental Angular**

Proporciona la higiene más completa de todos los espacios interdentales, aparatos de ortodoncia, prótesis fijas implantosoportadas, zonas furcales y diastemas.

UN TAMAÑO ADECUADO PARA CADA NECESIDAD

La gama **Lacer Cepillos Interdentales** facilita el acceso y la limpieza de cualquier ángulo y espacio interdental y zonas especiales.

ULTRAFINO	EXTRAFINO SUAVE	EXTRAFINO	FINO	CÓNICO
Espacios extremadamente estrechos	Espacios muy estrechos y muy sensibles	Espacios muy estrechos	Espacios estrechos	Espacios medianos y grandes
Ø prensado: **0,45 mm**	Ø prensado: **0,5 mm**	Ø prensado: **0,6 mm**	Ø prensado: **0,7 mm**	Ø prensado: **0,8 mm**

RECTO



LACER INTERDENTAL RECTO

Cepillo interdental de mango bimaterial y antideslizante recto. Fácil sujeción, lo que permite una mejor guía y manejo del cepillo. Cuello flexible y orientable para facilitar su utilización. El mango del cepillo es muy flexible para permitir el acceso incluso a los espacios intermolares.

ANGULAR



LACER INTERDENTAL ANGULAR

Cepillo interdental cuyo mango angulado permite un giro de hasta 90º. Al ser un mango más largo, permite un cómodo agarre para llegar a las piezas más distales.

Presentaciones y código nacional

Recto Ultrafino 6u.
C.N. 159268.2

Recto Extrafino Suave 6u.
C.N. 150530.9

Recto Extrafino 6u.
C.N. 150527.9

Recto Fino 6u.
C.N. 150528.6

Recto Cónico 6u.
C.N. 150529.3

Angular Ultrafino 6u.
C.N. 159270.5

Angular Extrafino Suave 6u.
C.N. 150526.2

Angular Extrafino 6u.
C.N. 150522.4

Angular Fino 6u.
C.N. 150523.1

Angular Cónico 6u.
C.N. 150525.5

Lacer® Picks Interdental

Palillos interdentales suaves y flexibles

Lacer Picks Interdental son unos palillos interdentales acabados en una punta de goma diseñados para la limpieza e higiene de los espacios interdentales.

Punta suave y flexible. Su forma se adapta a la mayoría de los espacios interdentales y proporciona una gran capacidad de limpieza de los restos de alimentos y placa bacteriana. No contiene partes metálicas por lo que no provoca efecto galvánico.

Mango ergonómico, largo y curvado para tener un mejor acceso a la mayoría de los espacios interdentales. Su recubrimiento de goma flexible, suave y antideslizante lo hace más fácil de usar.



Incluye un estuche de bolsillo para llevarlos de forma higiénica a todas partes y utilizarlos cuando sea necesario.



- **Acabados en punta de goma suave y flexible**
- **Mango ergonómico largo y curvado**
- **Sin partes metálicas**



Presentación y código nacional

Lacer Picks Interdentales
30 unidades
C.N. 190333.4

8 470001 903334

Lacer®
Sedas Dentales

Porque todos los espacios son importantes

LACER SEDA DENTAL

GRAN ARRASTRE

- Seda trenzada con cera para permitir acceder a espacios estrechos.
- Fibra multifilamento para incrementar la capacidad de arrastre.
- Con flúor.
- 50 metros.

MÁXIMA HIGIENE

Especialmente indicada en espacios estrechos, mal posicionamiento dental, etc, que requiere de un arrastre mayor, prevención de patologías por acúmulo de placa, y cuidado de boca sana.

LACER CINTA DENTAL (PTFE) Y LACER HILO DENTAL (PTFE)

Con Fibra PTFE
(Fibra Sintética de Politetrafluoretileno)

- Facilitar el deslizamiento incluso en aquellos espacios muy estrechos e irregulares.
- Alta capacidad de arrastre.
- Fibra monofilamento de gran resistencia, no se deshilacha.
- Con flúor. Sabor a menta.
- 50 metros.

LACER CINTA DENTAL

DELICADA CON LAS ENCÍAS

Cinta muy fina que se desliza en todos los espacios y con gran superficie de arrastre.

LACER HILO DENTAL

PARA LOS ESPACIOS MÁS ESTRECHOS

Hilo muy fino para permitir entrar en todos los espacios.

GINGILACER CINTA DENTAL

CON CERA

La nueva **Cinta Dental GingiLacer** está compuesta por filamentos de polietileno, trenzados de tal forma que generan una cinta muy suave, fina, resistente y elástica.

La gran capacidad de limpieza y suavidad de esta cinta, hace que sea idónea para la higiene de los espacios interdentales de encías delicadas o especialmente sensibles.

Las fibras de **GingiLacer Cinta Dental** arrastran eficazmente la placa dental, principal causante de gingivitis, inflamación y sangrado de encías.



Una seda dental para cada tipo de espacio interdental

Presentaciones y código nacional

Lacer Hilo Dental 50 m	GingiLacer Cinta Dental 50 m	Lacer Seda Dental 50 m	Lacer Cinta Dental 50 m
C.N. 214692.1	C.N. 172019.1	C.N. 336933.6	C.N. 213066.1
8 470002 146921	8 470001 720191	8 470003 369336	8 470002 130661

Pilexil®

ANTICAÍDA[1]

CÁPSULAS CAÍDA OCASIONAL

Pilexil Anticaída Cápsulas Caída Ocasional es la última innovación de la marca especialmente diseñada para mujeres y hombres con caída capilar ocasional o efluvio telógeno y aborda la caída capilar de forma integral, permitiendo no solo frenar la caída, sino también promover las condiciones óptimas para un crecimiento capilar saludable y duradero.

HAIR EXPOSOME TRIPL3 PROTECTION

Pilexil Anticaída Cápsulas Caída Ocasional actúa desde el interior, fortalece el folículo piloso, aumenta la densidad, refuerza la estructura capilar y previene el envejecimiento capilar, contrarrestando los efectos negativos del **HAIR EXPOSOME**.
Su exclusiva combinación de ingredientes activos, reforzada con 6 vitaminas y 3 minerales, actúa de manera integral:

- Folículo piloso: Frena la caída y ayuda a mantener la resistencia al estrés.
- Fibra capilar: Aumenta la densidad y refuerza la estructura capilar gracias a los precursores de Keratina, proteína estructural principal del cabello y las uñas.
- Cuero cabelludo: Aporta elasticidad y previene el envejecimiento capilar con precursores de colágeno y acción antioxidante.

1. Biotina, Selenio y Zinc: contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones normales.

COMBINACIÓN ÚNICA de INGREDIENTES para abordar la caída ocasional del cabello

El extracto natural de *Equisetum arvense* (7% sílice), la L-Cistina, la L-Metionina y la Vitamina B6 contribuyen a la síntesis normal de la cisteína.
La Coenzima Q10 y la Vitamina C contribuyen a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de la piel, así como a la protección de las células frente al daño oxidativo.
La Riboflavina y la Niacina contribuyen al mantenimiento de la piel en condiciones normales.
Por además, la Vitamina E participa en la protección de las células frente al daño oxidativo.

En épocas de estrés[1], recupera el control de tu cabello

www.pilexil.com



- **Indicado para hombres y mujeres en cambios estacionales y/o con estrés, agentes químicos (tintes, queratina,...) y déficit de nutrientes**
- **Indicado tanto para hombre como para mujer**
- **Excelente tolerancia**

Presentaciones y código nacional

Pilexil Anticaída Cápsulas Caída Ocasional
30 cápsulas
C.N. 225668.2
8 430340 068712

Pilexil Anticaída Cápsulas Caída Ocasional
60 cápsulas
C.N. 225669.9
8 430340 068729

Pilexil®

ANTICAÍDA

AMPOLLAS CAÍDA OCASIONAL

Pilexil Anticaída Ampollas Caída Ocasional actúa sobre los factores que intervienen en la caída del cabello.

Fórmula innovadora a base de Serenoa Serrulata, Zinc PCA, Tocoferil Nicotinato y vitaminas como: Biotina, Pantenol, Piridoxina y Vitamina E.

Via tópica.

HAIR EXPOSOME TRIPL3 PROTECTION

Pilexil Anticaída Ampollas Caída Ocasional es un tratamiento tópico formulado para fortalecer y nutrir el cabello desde la raíz, frenando la caída y normalizando su ciclo de crecimiento. Además, actúa sobre los diferentes factores del **HAIR EXPOSOME** que pueden provocar caída capilar ocasional: estrés, cambios estacionales, déficit nutricional, postparto, polución, radiación UV, estrés oxidativo y agentes químicos.

Su exclusiva combinación de ingredientes permite actuar de manera integral en 3 niveles:

• Folículo piloso: La *Serenoa Serrulata* combinada con el Zinc PCA inhibe la 5α-reductasa (enzima responsable de acelerar y acortar el ciclo capilar), evitando la caída del cabello.

• Fibra capilar: Complejo vitamínico a base de Provitamina B5, Vitaminas B6, E y H, que nutre y repara el cabello.

• Cuero cabelludo: El Tocoferil Nicotinato, junto con la Vitamina E, favorece la microcirculación y protege frente al daño oxidativo.

Especialmente formulado para mujeres y hombres con caída capilar ocasional o efluvio telógeno, **Pilexil Anticaída Cápsulas Caída Ocasional,** es un tratamiento tópico que ayuda a neutralizar los efectos negativos del **HAIR EXPOSOME,** devolviendo al cabello su fuerza y vitalidad natural.

www.pilexil.com



- **Indicado para hombres y mujeres en cambios estacionales y/o con estrés, agentes químicos (tintes, queratina,...) y déficit de nutrientes**
- **Indicado tanto para hombre como para mujer**
- **Excelente tolerancia**

Presentación y código nacional

Pilexil Ampollas Anticaída 15 x 5 ml

C.N. 208496.4

8 470002 084964

Pilexil®
ANTICAÍDA ForteMAX

Tratamiento completo para frenar la caída progresiva o puntual intensa del cabello

Pilexil Anticaída Forte MAX es un tratamiento eficaz para frenar la caída progresiva del cabello. Su fórmula innnovadora mutifactorial actúa a través de 4 complejos:

- Complejo antioxidante
- Complejo nutricional
- Complejo revitalizante
- Complejo 5 alfa

SPRAY Y AMPOLLAS

Pilexil Forte Max Spray Anticaída y **Pilexil Forte Max Ampollas Anticaída** son un tratamiento eficaz para frenar la caída del cabello reforzando el anclaje del folículo, normalizando el crecimiento capilar y mejorando el aporte de nutrientes para formar un cabello sano y fuerte.

Gracias al Acetato de tocoferol y la Niacina, evitan la formación de radicales libres que dañan el cabello y lo debilitan, haciendo que el cabello continúe con su ciclo normal de crecimiento.

** Biotina, Selenio y Zinc: contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones normales.*
** Zinc: contribuye al mantenimiento de las uñas en condiciones normales.*

Su nueva fórmula innnovadora nutre la fibra capilar desde la raíz favoreciendo la microcirculación del cuero cabelludo y promueve un crecimiento saludable del cabello.

Gracias a la acción de la *Serenoa serrulata* y *Humulus lupulus*, **Pilexil Anticaída Forte MAX** promueve el anclaje de la fibra capilar al cuero cabelludo, a través de un potente complejo que evita la caída del cabello.

CÁPSULAS Y BEBIBLE

Pilexil Forte Max Cápsulas Anticaída y el nuevo formato **Pilexil Forte Max Bebible Anticaída** son un tratamiento para la caída progresiva del cabello*, y para las uñas** mejorando el aporte de nutrientes a tu organismo.

Las nuevas fórmulas de los complementos alimenticios de **Pilexil Anticaída Forte MAX** contienen Riboflavina, Vitamina E, Zinc y Selenio que contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo.

También contienen Biotina, Selenio y Zinc que contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones normales, además de Niacina, Ácido pantoténico, Riboflavina, Vitamina B12 y Vitamina B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

La fórmula está reforzada por *Serenoa repens*, *Cucurbita pepo*, *Humulus lupulus* y Niacina.



Lacer

El pelo tiene su ciencia.
Nueva fórmula innovadora multifactorial.



- **Indicado para mujeres y hombres con alopecia androgenética (AGA), menopausia y/o etapa madura del cabello, cambios estacionales, estrés, agentes externos (radiacion UV), deficit de nutrientes, vitaminas o minerales y agentes químicos (tintes, queratina...)**
- **Gama completa (spray, ampollas, cápsulas y nuevo formato bebible)**
- **Eficacia demostrada**
- **Excelente tolerancia**

Presentaciones y código nacional

Pilexil Forte Max Spray 120 ml	Pilexil Forte Max Ampollas 20 u. x 5 ml	Pilexil Forte Max Cápsulas 60 u.	Pilexil Forte Max Bebible 30 u.
C.N. 216678.3	C.N. 216677.6	C.N. 215888.7	C.N. 215891.7
8 430340 065797	8 430340 068699	8 470002 158887	8 470002 158917

Pilexil®
ANTICAÍDA

Nuevo tratamiento único y complementario a todo tipo de caídas

HAIR EXPOSOME TRIPL3 PROTECTION

¿Sabías que el cabello puede verse afectado por múltiples factores en hombres y mujeres?

El **HAIR EXPOSOME** es la suma de todos los factores externos e internos (radiación, UV, contaminación, estrés, cambios hormonales...) que pueden debilitar el folículo piloso, dañar la fibra capilar y afectar la salud del cuero cabelludo contribuyendo a la caída del cabello.

Pilexil ANTICAÍDA Champú TRIPL3 PROTECTION es un champú de tratamiento indicado para frenar la caída, proteger y fortalecer el cabello desde la raíz, normalizando su ciclo de crecimiento.

Cabello más resistente y saludable gracias a su fórmula avanzada, que neutraliza los factores negativos del **HAIR EXPOSOME** que pueden afectar a la caída del cabello.

www.pilexil.com

Su fórmula innovadora multifactorial frena la caída de manera integral actuando en 3 niveles:

- Folículo piloso: Frena la caída y normaliza el ciclo del crecimiento del cabello. SERENOA SERRULATA + CAFEÍNA.
- Fibra capilar: Fortalece, suaviza y aumenta la densidad. CERAMIDA 2 + INULINA.
- Cuero cabelludo: Hidrata, protege y aporta elasticidad. NIACINAMIDA + ÁCIDO HIALURÓNICO.

COMBINACIÓN ÚNICA de INGREDIENTES para abordar la caída del cabello de manera integral

El extracto natural de *Serenoa Serrulata* inhibe la enzima 5alfa-reductasa y ayuda a frenar la caída del cabello.

La Cafeína refuerza el anclaje capilar revitalizando el folículo y favoreciendo la microcirculación del cuero cabelludo.

La Ceramida 2 protege frente a los factores externos asociados a radiación UV, contaminación y factores químicos. Fortalece la fibra capilar manteniéndola en óptimas condiciones y mejorando su aspecto.

El Ácido Hialurónico y la Niacinamida proporcionan hidratación profunda y protección antioxidante al cuero cabelludo, además de mejorar su elasticidad.

La Inulina, prebiótico que ayuda a las defensas naturales del cabello, alivia la irritación y aporta suavidad.



TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE

APTO TODO TIPO DE CABELLOS

SIN COLORANTES

USO FRECUENTE

INDICACIONES:

- **Coadyuvante para tratamientos anticaída tópicos o complementos alimenticios, en hombres y mujeres.**
- **Formulado para mejorar el aspecto de cabellos finos, frágiles, quebradizos o sin vitalidad, con tendencia a la caída, y cueroscabelludos con exceso de sebo.**

Presentaciones y código nacional

Pilexil Anticaída Champú Triple Protection
275 ml
C.N. 221290.9
8 430340 065919

Pilexil Anticaída Champú Triple Protection
450 ml
C.N. 221292.3
8 430340 065926

Pilexil Anticaída Champú Triple Protection
900 ml
C.N. 221293.0
8 430340 065933

Pilexil® ANTICAÍDA

Tratamiento único y complementario a todo tipo de caídas

- **Eficacia demostrada**
- **Indicado tanto para hombre como para mujer**
- **Excelente tolerancia**

PILEXIL ACONDICIONADOR ANTICAÍDA

Indicado para acondicionar el cabello, a la vez que frena la caída, lo fortalece y lo desenreda.

Uso frecuente.

Formulado a base de Serenoa Serrulata, Zinc PCA y vitaminas específicas para el cabello.

www.pilexil.com

El pelo tiene su ciencia.



Presentación y código nacional

Pilexil Acondicionador Anticaída 200 ml

C.N. 208832.0

8 470002 088320

Pilexil®

ANTICASPA

Un cabello bonito libre de caspa

PILEXIL CHAMPÚ CASPA SECA

Indicado para el tratamiento de la caspa seca.

Su completa formulación regula la descamación y destruye las membranas celulares del Malassezia (microorganismo característico de la caspa). También elimina el picor del cuero cabelludo.

Formulada a base de Terpineol + Extracto de Sauce, Ac. Salicílico y Climbazol.

PILEXIL CHAMPÚ CASPA GRASA

Indicado para el tratamiento de la caspa grasa.

Su completa formulación ofrece efecto frente a los agentes que causan la caspa como Malassezia, regula el exceso del sebo, disminuye la descamación del cuero cabelludo y elimina el picor.

Formulada a base de Terpineol + Extracto de Sauce, Ac. Salicílico, Climbazol y Lipoaminoácido seborregulador.

www.pilexil.com

- **Fórmulas innovadoras y sin efecto rebote**
- **Eficacia demostrada**



Presentaciones y código nacional

Pilexil Champú Caspa Seca 300 ml
C.N. 168333.5
8 470001 683335

Pilexil Champú Caspa Grasa 300 ml
C.N. 168337.3
8 470001 683373

Thrombocid®

Mejora el flujo sanguíneo

Thrombocid está indicado en:

- Alivio eficaz de la pesadez y tirantez en piernas con varices, en adultos, desde la primera aplicación.
- Alivio de hematomas superficiales producidos por golpes, en adultos y niños mayores de 1 año.



Con Pentosano Polisulfato Sódico

Alivio desde la primera aplicación

Ahora Thrombocid Forte también en 100 g

PRINCIPIO ACTIVO
Pentosano Polisulfato sódico

THROMBOCID FORTE
5 veces más concentración

Presentaciones y código nacional

Thrombocid 1 mg/g 30 g	Thrombocid 1 mg/g 60 g	Thrombocid Forte 5 mg/g 60 g	Thrombocid Forte 5 mg/g 100 g
C.N. 696989.2	C.N. 696971.7	C.N. 843987.4	C.N. 726431.6
8 470006 969892	8 470006 969717	8 470008 439874	8 470007 264316

anso

Alivio de la inflamacion, el dolor, el picor y el escozor causado por las hemorroides

Anso está indicado para el tratamiento local de las afecciones hemorroidales internas y externas.

TRIPLE ACCIÓN

- Acción analgésica: Lidocaína clorhidrato (anestésico).
- Acción antiinflamatoria: Triamcinolona acetónido (corticoide).
- Acción antitrombótica: Pentosano Polisulfato sódico.



Presentación y código nacional

Anso 50 g
C.N. 709162.2

8 470007 091622

ansollitas

Higiene anal sin dolor

Ansollitas permite una limpieza suave y eficaz. Ayuda al alivio de la irritación y el escozor.

AYUDA AL ALIVIO DE LA IRRITACIÓN

- Aloe Vera: Hidrata la piel.
- Canadian Willowherb: Calmante.

PERMITE UNA LIMPIEZA SUAVE Y EFICAZ

- Celulosa con fibra de origen vegetal.
- 100% natural.

AYUDA AL ALIVIO DEL ESCOZOR

- Castaño de indias: Favorece la microcirculación del área anal.
- Centella asiática: Favorece el proceso natural de cicatrización.



- **Toallitas húmedas para la higiene diaria de la zona de hemorroides externas**
- **Biodegradable**

Presentación y código nacional

Ansollitas
50 unidades
C.N. 156256.2

8 470001 562562

Ansollitas
10 unidades
C.N. 156255.5

8 470001 562555

Flavia

Para una menopausia confortable

Flavia Nocta, Flavia Plus y **el nuevo Flavia Libital** son complementos alimenticios que ayudan a aliviar los signos molestos de la menopausia:

- Sudoración / Sofocos
- Conciliación del sueño
- Irritabilidad
- Cansansio / Fatiga
- Mantenimiento de los huesos
- Libido

FLAVIA PLUS

Gracias a su ingredientes, **Flavia Plus** actúa sobre los signos de la menopausia en mujeres sin problemas de sueño o en tratamiento con un producto para conciliarlo.

- Las Isoflavonas de soja son hormonas vegetales con una estructura muy parecida a las hormonas femeninas. Es una alternativa a la terapia hormonal sustitutiva.
- Las Vitamina B12, B6 y los folatos ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal, lo que ayuda al estado de ánimo.
- Además, la Vitamina B6 ayuda a regular la actividad hormonal.
- La Vitamina D, K y calcio contribuyen al mantenimiento de los huesos.

FLAVIA NOCTA

Flavia Nocta añade a la fórmula anterior 2 nuevos componentes que además de aliviar los signos propios de la menopausia, ayudan a las mujeres con problemas para conciliar el sueño.

- El Lúpulo (*Humulus Lupulis L.*) ayuda a aliviar molestias como sofocos, sudoración, inquietud e irritabilidad.
- La Melatonina contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.

FLAVIA LIBITAL

Flavia Libital además de ayudar a aliviar los signos de la menopausia, ayuda a aumentar la libido gracias a la incorporación los siguientes ingredientes en su fórmula:

- El Azafrán que contiene crocinas y safranal reconocidos por ayudar a estimular la libido.
- El Fenogreco que es una fuente natural de saponinas y otros fitonutientes.
- Las isoflavonas de soja que tienen una estructura muy parecida a la de las hormonas sexuales femeninas y garantizan el aporte de Genisteína y Daidzeina.



ESTIMULA LA LIBIDO · SUDORACIÓN SOFOCOS · CONCILIACIÓN DEL SUEÑO · CANSANCIO FATIGA · IRRITABILIDAD · MANTENIMIENTO DE LOS HUESOS

1. IQVIA mercado de productos Menopausia, ventas en Farmacia a TAM Enero 2024.

Presentaciones y código nacional

Flavia Plus
30 cápsulas
C.N. 170680.5
8 470001 706805

Flavia Nocta
30 cápsulas
C.N. 178687.6
8 470001 786876

Flavia Libital
30 comprimidos
C.N. 220071.5
8 430340 065605

Ainara BY Flavia

Gel hidratante vaginal

Alivio inmediato y prolongado de la sequedad vaginal

AINARA by Flavia es un producto sanitario que proporciona un alivio inmediato y prolongado de la sequedad vaginal mejorando la función sexual y la calidad de vida de las mujeres en perimenopausia y menopausia. [1,2]

AINARA by Flavia ha demostrado una mejoría significativa de los síntomas más molestos, con independencia de su severidad. Los estudios indican:

- Una reducción del **71%** de la sequedad vaginal. [2,3]
- Una reducción del **62%** de la dispaurenia. [2,3]
- Una reducción del prurito en el **34%** de las mujeres. [2,3]

A su vez, **AINARA by Flavia** disminuyó el dolor vaginal durante las relaciones sexuales (valorado mediante EVA), aumentó el índice de la función sexual femenina (valoración FSFI) y mejoró tanto la sequedad vaginal como la irritación local (valorados mediante EVA). [2]

Las pacientes de **AINARA by Flavia** reportaron una mejoría de la calidad de vida, sientiéndose mejor con el tratamiento (Test SF-12). [2]

- **Mayor tiempo en contacto con la mucosa vaginal**
- **Menor flujo tras aplicación**
- **Mayor sensación de comodidad**

1. Cagnacci, A., Franco Barattini, D., Casolati, E., Mangrella, M., Piccolo, E., Piazza, R., Pecoroni, A., Rosu, S., & Cristian Pătrașcu, L. (2024). Short and long-term effect of polycarbophil vaginal gel on vaginal atrophy of peri- and post-menopausal women. The TRIPLE study. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, 299, 303–308. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2024.06.033. 2. Cagnacci A, Barattini DF, Casolati E, Pecoroni A, Mangrella M, Patrascu LC. Polycarbophil vaginal moisturizing gel versus hyaluronic acid gel in women a ected by vaginal dryness in late menopausal transition: A prospective randomized trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2022 Mar;270:239-245. doi: 10.1016/j.ejogrb.2022.01.021. Epub 2022 Feb 1. 3. Estévez Tesouro J. et al. Effect of a non-hormonal mucoadhesive polycarbophilic vaginal gel on prevalent vaginal symptoms in women who develop vaginal atrophy. 21st ESGO. Congress of the European Society for Gynaecological Oncology_Athens, Greece, 2 – 5 November 2019.

Ainara cumple con la normativa de productos sanitarios. Advertencia: el uso de Ainara está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, lavar con abundante agua. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Lacer

Alivio inmediato y prolongado de la sequedad vaginal

Mejora la función sexual y la calidad de vida

EXPERTOS EN SALUD DE LA MUJER • EXPERTOS EN SALUD DE LA MUJER •
EFICACIA CLÍNICA DEMOSTRADA EN MENOPAUSIA



Presentación y código nacional

Ainara by Flavia
Gel hidratante vaginal 30g

C.N. 164760.3

8 430340 066305

Talquistina®

TALCO, CREMA Y LOCIÓN

Para pieles sensibles e irritadas

TALQUISTINA TALCO Y CREMA

La acción balsámica y calmante de la Calamina proporciona un alivio eficaz del picor en la piel irritada o sensibilizada por alguna causa externa. **Talquistina Crema** además incorpora Rhamnosoft con propiedades antiirritantes y que atenúan el enrojecimiento.





TALQUISTINA LOCIÓN

La nueva **Talquistina Loción** contiene Calamina y también Rhamnosoft. Su textura fluida permite una fácil y cómoda aplicación en zonas extensas y se absorbe muy fácilmente. Indicada para el alivio del picor por causas cotidianas como depilación, rozaduras, piel sensible, piel seca, escozor, etc.

• Testados bajo control dermatológico.



Presentaciones y código nacional

Talquistina
Talco 50 g
C.N. 152729.5
8 470001 527295

Talquistina
Crema 50 ml
C.N. 158655.1
8 470001 586551

Talquistina
Crema 100 ml
C.N. 163412.2
8 470001 634122

Talquistina
Loción 200 ml
C.N. 189317.8
8 470001 893178

Talquistina®

CREMA HIDRATANTE

Para pieles sensibles con picor



Talquistina Crema Hidratante de uso diario, está especialmente desarrollada para el cuidado diario de pieles sensibles con picor ya que proporciona un cuidado y una hidratación de larga duración.

PROTEGE, HIDRATA Y CALMA LA SEQUEDAD Y EL PICOR EN LA PIEL

Con el innovador Calm Agent, formulado a base de:

- Dihidroavenantramida D: una molécula exclusivamente desarrollada potenciando los beneficios de la avena, que actúa de manera eficaz calmando y aliviando las pieles sensibles con picor.
- Aceite de Avena y Manteca de Karité: ingredientes naturales, que proporcionan hidratación de larga duración y restauran la barrera lipídica de la piel, aportando un alivio rápido, eficaz y duradero en las pieles sensibles con picor.

Apta para pieles sensibles

Dermatológicamente testada

Presentación y código nacional

Talquistina
Crema Hidratante 400 ml
C.N. 208872.6
8 470002 088726

Talquistina

PIEL EN CALMA

OLEOGEL DE DUCHA

Higiene y cuidado diario para pieles sensibles con picor

Talquistina Oleogel de ducha está especialmente desarrollado para la higiene y el cuidado diario de pieles con picor proporcionando una hidratación de larga duración. Hidrata, calma y limpia suavemente la piel. Previene el picor y los episodios de picor. Protege la barrera cutánea. No comedogénico.

Apto para pieles sensibles. Apto para toda la familia a partir de 3 meses. No pica en los ojos. Testado dermatológicamente.

- **Efecto calmante y antipicor desde la primera aplicación**
- **Hidratación instantánea y a largo plazo**
- **Protege la barrera cutánea**

FÓRMULA DERMATOLÓGICA

- COMPLEJO ANTIPICOR
  Alivio inmediato y duradero del picor para un uso diario.
- BIOLÍPIDOS ESENCIALES
  Refuerzo de la barrera cutánea para una piel más resistente y equilibrada.
- ACEITE DE AVENA
  Acción nutritiva con efecto calmante, para disminuir la sensación de tirantez.



¡NUEVO!

Presentación y código nacional

Talquistina Oleogel de ducha
C.N. 224382.8

8 430340 067883

Talquistina
REGENERA+
BÁLSAMO REPARADOR

Regenera tu piel, recupera tu calma

Talquistina REGENERA+ es un bálsamo reparador indicado para calmar la piel afectada por picor, irritación, rozaduras, grietas y tatuajes.

Talquistina REGENERA+ mejora la función barrera de la piel desde la primera aplicación y de forma prolongada, reduciendo significativamente la pérdida transepidérmica de agua. Además, hidrata intensamente y de forma prolongada, mejorando tanto la hidratación superficial como la profunda y reduciendo clínicamente la descamación, sequedad, picor y tirantez.

- **Acelera la regeneración**
- **Mejora la descamación**
- **Reduce la sensación de picor y tirantez**
- **Mejora la hidratación y reduce la pérdida de agua**

REPAIR AGENT
Niacinamida+Pantenol+DPG

El nuevo bálsamo reparador de **Talquistina** incorpora en su fórmula Niacinamida que repara la función barrera, Pantenol (ProVitamina B5) que regenera e hidrata y DPG (Dipotassium glycerinate) que calma y alivia el picor.



NUEVO

Presentación y código nacional

Talquistina REGENERA+
C.N. 222203.8

8 430340 066497

Talquistina® POSTPICA

Alivio eficaz del picor

Talquistina PostPica es un gel suave y eficaz, avalado por el éxito de Talquistina, que alivia y calma rápidamente las molestias ocasionadas por insectos, medusas o plantas. Especialmente indicado para todo tipo de pieles, incluyendo las más sensibles, que buscan fórmulas específicas para calmar la piel.

Su fórmula patentada incorpora Zanthoxylum (proporciona alivio del picor) Palmitoyl Tripeptide-8 (calma y suaviza la irritación de la piel) y Menthyl y Lauryl PCA (refrescan e hidratan la piel agredida). Esta combinación de ingredientes alcanza una disminución del 100% del área de enrojecimiento a los 90 minutos de su aplicación, así como un 100% de la disminución del picor a los 60 minutos.





Presentación y código nacional

Talquistina PostPica 15 ml
C.N. 215366.0

8 470002 153660

Talquistina TATTOO

Cuidado de la piel tatuada



Talquistina Tattoo es una crema indicada para el cuidado de la piel tatuada. Ayuda a mantener el tatuaje en buen estado proporcionando 24 horas de hidratación.

- Mantiene el brillo, la definición y los colores del tatuaje en buen estado.
- Textura de fácil absorción.
- Factor de protección solar SPF 25.
- Apto para pieles sensibles.

Gracias a su composición **Talquistina Tattoo** consigue una acción reparadora, hidratante, reestructurante y antioxidante.

- ACEITE DE ROSA MOSQUETA
  Regenera, revitaliza y repara la epidermis.
- AQUAXYL™
  Mejora la función barrera de la piel.
  Reestructurante.
  Hidrata la piel.
- MANTECA DE KARITE
  Con propiedades antioxidantes y reparadoras.
  Hidrata en profundidad.

Presentación y código nacional

Talquistina Tattoo 70 ml
C.N. 195155.7

8 470001 951557

BALSODERM
CUIDADO POST SOLAR

Calma y refresca la piel después del sol

La gama de **Balsoderm Post Solar** ha sido desarrollada con el objetivo de cuidar la piel después del sol.

Balsoderm Post Solar ha sido formulado con principios activos idóneos para restablecer el equilibrio lipídico de la piel tras la exposición solar.

BALSODERM POST SOLAR INTENSIVE

Calma, Hidrata y Repara la piel después del sol

- Efecto calmante.
- Restablece el equilibrio de la piel tras la exposición solar de forma inmediata.
- Hidrata y repara profundamente.
- Dermatológicamente testado.



Presentación y código nacional

Balsoderm PS Intensive
Spray 200 ml
C.N. 169471.3

8 470001 694713

virlix *plus*

Alivio temporal de los síntomas de la alergia y descongestionante nasal

Alivio temporal de la congestión nasal y demás síntomas asociados a las alergias, tales como estornudos, goteo nasal, picor nasal y picor de los ojos, producidos por el polen de las plantas, animales domésticos, polvo u otros agentes alergénicos, cuando se requiera la actividad antialérgica junto con la descongestión nasal.



Composición:
Cetirizina + pseudoefedrina

Presentación y código nacional

Virlix Plus
14 comprimidos EFP
C.N. 659672.2

8 470006 596722

VIRLIX PLUS

NOMBRE DEL MEDICAMENTO: VIRLIX PLUS 5 mg/120 mg comprimidos de liberación prolongada. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Cada comprimido contiene 5 mg de cetirizina dihidrocloruro formulado para liberación inmediata y 120 mg de pseudoefedrina hidrocloruro formulado para liberación prolongada. Excipientes: ***Primera capa:*** Hipromelosa (E 464), Celulosa microcristalina, Sílice coloidal anhidra, Estearato de magnesio. ***Segunda capa:*** Lactosa 43,23mg, Celulosa microcristalina, Croscarmelosa de sodio, Sílice coloidal anhidra, Estearato de magnesio. ***Película de recubrimiento:*** Opadry Y-1-7000 que contiene: Hipromelosa (E 464), Dióxido de titanio (E 171), Macrogol 400. **FORMA FARMACÉUTICA:** Comprimidos de liberación prolongada. Comprimidos blancos o casi blancos, redondos y biconvexos. **DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas:** VIRLIX PLUS está indicado para el tratamiento de los síntomas nasales y oculares de la rinitis alérgica estacional cuando se acompaña de congestión nasal en adultos y adolescentes a partir de 12 años. **Posología y forma de administración:** Posología: Adultos y adolescentes a partir de 12 años: 1 comprimido 2 veces al día (por la mañana y por la noche); máximo 2 comprimidos en 24 horas. Mayores de 60 años: Esta asociación no deberá administrarse a pacientes de edad superior a 60 años (ver advertencias y precauciones especiales de empleo). Pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave: No hay datos para documentar la relación eficacia/seguridad en pacientes con insuficiencia renal. Ya que la cetirizina se elimina principalmente por vía renal en casos en los que no se pueda utilizar un tratamiento alternativo, se deberán individualizar los intervalos de dosificación de acuerdo con la función renal. Consulte la siguiente tabla y ajuste la dosis según proceda. Para utilizar esta tabla de dosificación, es preciso disponer de una estimación del aclaramiento de creatinina (CLcr) del paciente, en ml/min. El valor de CLcr (en ml/min) se puede estimar a partir de la determinación de creatinina en suero (mg/dl) mediante la siguiente fórmula:

$$CLcr = \frac{[140 - \text{edad (años)}] \times \text{peso (kg)}}{72 \times \text{creatinina en suero (mg/dl)}} \quad (\times 0{,}85 \text{ para mujeres})$$

Ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal:

Grupo	*Aclaramiento de creatinina (ml/min)*	*Dosis y frecuencia*
Normal	⩾ 80	10 mg una vez al día
Leve	50 – 79	10 mg una vez al día
Moderada	30 – 49	5 mg una vez al día
Grave	<30	5 mg una vez cada 2 días
Enfermedad renal terminal – pacientes que precisan diálisis	<10	Contraindicado

Pacientes con insuficiecia hepática: Esta combinación no deberá administrarse a pacientes con insuficiencia hepática. *Población pediátrica:* VIRLIX PLUS está contraindicado en niños menores de 12 años (ver contraindicaciones). Forma de administración: Los comprimidos deben ingerirse enteros con ayuda de algún líquido, y no se deben partir, masticar, ni triturar. La duración del tratamiento deberá ser lo más breve posible y no debe exceder de 7 días. El tratamiento no deberá continuar una vez desaparecidos los síntomas. La toma concomitante de este medicamento con comidas o bebidas no afecta a la eficacia del mismo. **Contraindicaciones:** Cetirizina-pseudoefedrina está contraindicado en pacientes con: hipersensibilidad a los principios activos, a efedrina, a cualquier piperazina, o a alguno de los excipientes, hipertensión arterial grave o insuficiencia coronaria grave, insuficiencia renal grave, hipertiroidismo no controlado, arritmias graves, feocromocitoma, glaucoma de ángulo cerrado, hipertrofia de próstata, retención urinaria, antecedentes de accidente cerebrovascular, riesgo elevado de sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico. Cetirizina-pseudoefedrina está contraindicado en pacientes tratados de forma concomitante con: dihidroergotamina, inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAOs) hasta dos semanas después de haber finalizado este tratamiento. Virlix Plus está contraindicado en niños menores de 12 años (ver posología y contraindicaciones). **Advertencias y precauciones especiales de empleo:** Cetirizina-pseudoefedrina, debido a que contiene pseudoefedrina debe utilizarse con precaución en pacientes con diabetes, hipertiroidismo, hipertensión arterial, taquicardia, arritmia cardiaca, isquemia cardiaca, insuficiencia renal o hepática moderada y en ancianos. Cetirizina-pseudoefedrina está contraindicado en niños menores de 12 años (ver indicaciones terápeuticas y posología) ya que no se han realizado estudios en este grupo de pacientes. También debe utilizarse con precaución en pacientes que estén tomando: Medicamentos simpático-miméticos tales como descongestionantes, inhibidores del apetito, y psicoestimulantes, tales como anfetaminas (efectos combinados en el sistema cardiovascular), antidepresivos tricíclicos, medicamentos antihipertensivos (efectos de los medicamentos antihipertensivos reducidos), (ver interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción), alcohol u otros depresores del sistema nervioso central (SNC) (aumentan la depresión del SNC y los problemas para realizar acciones), glucósidos cardiacos, tales como digoxina o digitoxina (riesgo de arritmia cardiaca). También, debe prestarse atención a

pacientes con factores que puedan incrementar el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico, (como el uso concomitante de vasoconstrictores (ej. bromocriptina, pergolida, lisurida, cabergolina, ergotamina), o cualquier otro medicamento descongestionante (ej. fenilpropanolamina, fenilefrina, efedrina) usado por vía oral o nasal, debido al riesgo de vasoconstricción y de aumento de la presión arterial. Debido al efecto vasoconstrictor de la pseudoefedrina, se requiere precaución en pacientes que tienen riesgo de hipercoagulación, por ejemplo en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Se requiere precaución en pacientes hipertensos que están siendo tratados concomitantemente con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), ya que ambos, la pseudoefedrina y los AINEs, pueden aumentar la presión sanguínea. Al igual que con otros estimulantes centrales, se ha observado abuso a la pseudoefedrina. Este medicamento contiene pseudoefedrina hidrocloruro, que puede dar lugar a un resultado positivo en el Control de Dopaje que se practica a los deportistas. Advertencia sobre excipientes: Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabsorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:** No se han realizado estudios de interacción con el medicamento combinado de cetirizina-pseudoefedrina. Se han realizado estudios de interacciones farmacocinéticas con cetirizina y cimetidina, ketoconazol, eritromicina, azitromicina, antipirina o pseudoefedrina; no se han observado interacciones farmacocinéticas. En un estudio dosis múltiple de teofilina (400 mg una vez al día) y cetirizina, hubo una pequeña disminución (16%) en el aclaramiento de la cetirizina, mientras que la exposición a la teofilina no se alteró por el uso concomitante con cetirizina. Estudios con cetirizina y cimetidina, glipizida, diazepam o pseudoefedrina no han revelado evidencia de interacciones farmacodinámicas. Estudios con cetirizina y azitromicina, eritromicina, ketoconazol, teofilina, antipirina o pseudoefedrina no han revelado evidencia de interacciones clínicas. En particular, la administración concomitante de cetirizina con macrólidos o ketoconazol nunca ha provocado cambios clínicamente relevantes en el electrocardiograma (ECG). En un estudio dosis múltiple con ritonavir (600 mg dos veces al día) y cetirizina (10 mg al día), el grado de exposición de cetirizina se incrementó alrededor del 40% mientras que la exposición a ritonavir se alteró ligeramente (-11%) tras la administración concomitante con cetirizina. El uso concomitante de aminas simpaticomiméticas con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAOs) puede dar lugar a crisis hipertensivas. Debido a la acción prolongada de los IMAOs, dicha interacción aún es posible en los 15 días siguientes tras la interrupción del tratamiento. Las aminas simpaticomiméticas reducen el efecto antihipertensivo de los bloqueantes beta-adrenérgicos y de medicamentos que interfieran con la actividad simpática, tales como la metildopa, guanetidina y reserpina (ver advertencias y precauciones especiales de empleo). La administración de linezolida con pseudoefedrina puede resultar en un incremento de la presión sanguínea en pacientes con presión normal. El uso concomitante de pseudoefedrina con glucósidos cardiacos, tales como digoxina o digitoxina en pacientes con marcapasos puede incrementar la respuesta al estímulo de éste; por lo tanto, el uso de cetirizina-pseudoefedrina debe evitarse en pacientes tratados con glucósidos cardiacos (ver advertencias y precauciones especiales de empleo). Los antiácidos e inhibidores de la bomba de protones incrementan el grado de absorción de la pseudoefedrina; el caolín la disminuye. El uso concomitante con agentes anestésicos halogenados puede provocar o empeorar la arritmia ventricular. La cetirizina inhibe las pruebas cutáneas de alergia, por lo que se debe suprimir el tratamiento con cetirizina-pseudoefedrina durante 3 días antes de realizarlas. Comidas altas en grasa no modificaron la biodisponibilidad de ambos principios activos del medicamento. Sin embargo redujeron y retrasaron el pico de concentración plasmática de cetirizina. **Fertilidad, embarazo y lactancia:** Embarazo: No hay datos adecuados del uso de cetirizina-pseudoefedrina en embarazadas. *Virlix Plus no se recomienda durante el embarazo.* El uso de pseudoefedrina durante el primer trimestre de embarazo ha sido asociado con un incremento de la frecuencia de gastrosquisis (defecto en el desarrollo de la pared intestinal con hernia intestinal) y de atresia del intestino delgado (obstrucción congénita del intestino delgado). Debido a las propiedades vasoconstrictoras de la pseudoefedrina, no debe usarse durante el tercer trimestre del embarazo, ya que puede inducir una reducción en la circulación utero-placentaria. Los datos en un número limitado de mujeres embarazadas expuestas indicaron que la cetirizina no produjo efectos adversos en embarazadas o en la salud del feto/recién nacido. Los datos en animales relacionados con el embarazo, desarrollo embriofetal, parto o desarrollo post-natal son insuficientes. Lactancia: Cetirizina y pseudoefedrina se excretan en la leche materna. Por lo tanto, Virlix Plus no está recomendado en mujeres en periodo de lactancia. Fertilidad: No hay datos disponibles sobre la fertilidad en humanos. Un estudio en ratas no reveló ningún impacto sobre la fertilidad de la combinación de cetirizina: pseudoefedrina (1:24). Se observaron cambios en la morfología y recuento espermático en ratas macho que recibieron pseudoefedrina por vía intraperitoneal. **Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:** Los pacientes que vayan a conducir vehículos, realizar actividades potencialmente peligrosas o manejar maquinaria no deben exceder la dosis recomendada y deben tener en cuenta la respuesta individual al medicamento. Los pacientes que experimenten somnolencia deben abstenerse de conducir, realizar actividades potencialmente peligrosas o manejar maquinaria. Pacientes a los que se les administró cetirizina a la dosis aprobada de 10 mg/día, no mostraron ningún efecto clínico relevante en las medidas objetivas sobre la capacidad para conducir, función cognoscitiva, la respuesta motora o la latencia al sueño. Sin embargo, el uso conjunto de cetirizina con alcohol y otras sustancias con actividad depresora del SNC pueden causar reducciones adicionales en el estado de alerta y disminución de la actividad. No se han notificado ni se esperan efectos negativos de la pseudoefedrina sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas.Debería tenerse en cuenta que variaciones en estos efectos existen con diferentes medicamentos en diferentes individuos: en ensayos clínicos, se han notificado casos de sensación subjetiva de somnolencia. A dosis superiores a las recomendadas como normales, pueden aparecer efectos del sistema nervioso central.

Reacciones adversas: Estudios clínicos: *Resumen:* En estudios controlados se han descrito reacciones adversas, en algo más del 1 % de los pacientes tratados con cetirizina/pseudoefedrina, que no difieren de las descritas individualmente para cetirizina o pseudoefedrina. Experiencia post-comercialización: Los efectos adversos encontrados por el uso de cetirizina se relacionan principalmente con efectos depresores sobre el SNC o efectos paradójicos estimulantes del SNC, con actividad de tipo anticolinérgica o con reacciones de hipersensibilidad (incluyendo shock anafiláctico), mientras que los efectos adversos por el uso de pseudoefedrina es más probable que estén relacionados con estimulación del SNC, y trastornos cardiovasculares. Se han identificado en publicaciones literarias casos aislados de accidente cerebrovascular y colitis isquémica por el uso de pseudoefedrina. Se han notificado las siguientes reacciones adversas. Se muestran de acuerdo a MedDRA, Clasificación Órgano-Sistema y por frecuencia estimada. Las frecuencias se definen como: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100, <1/10); poco frecuentes (≥ 1/1.000, <1/100); raras (≥1/10.000, <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). *Trastornos del sistema inmunológico: Raros:* reacciones de hipersensibilidad (incluido shock anafiláctico). *Trastornos psiquiátricos: Frecuentes:* nerviosismo, insomnio. *Poco frecuentes:* ansiedad, agitación. *Raros:* alucinaciones. *Muy raros:* trastornos psicóticos. *Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes:* vértigo, mareos, dolor de cabeza, somnolencia. *Raros:* convulsiones, temblor. *Muy raros:* disgeusia, accidentes cerebrovasculares (derrame cerebral). *Trastornos oculares: Frecuencia no conocida:* trastornos de la acomodación visual, visión borrosa, midriasis, dolor ocular, deterioro visual, fotofobia. *Trastornos cardiacos: Frecuentes:* taquicardia. *Raros:* arritmia. *Frecuencia no conocida:* palpitaciones. *Trastornos vasculares: Raros:* palidez, hipertensión. *Muy raros:* colapso cardiovascular. *Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Frecuencia no conocida:* disnea. *Trastornos gastrointestinales: Frecuentes:* sequedad de boca, náuseas. *Raros:* vómitos. *Frecuencia no conocida:* colitis isquémica. *Trastornos hepatobiliares: Raros:* trastornos en la función hepática (aumento de las transaminasas, de la fosfatasa alcalina, gamma-GT, bilirrubina). *Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Raros:* piel seca, prurito, aumento de la sudoración, urticaria. *Muy raros:* erupción asociada al medicamento, edema angioneurótico. *Frecuencia no conocida:* pustulosis exantemática generalizada aguda. *Trastornos renales y urinarios: Raros:* disuria. *Trastornos del aparato reproductor y de la mama: Frecuencia no conocida:* disfunción eréctil. *Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Frecuentes:* astenia. **Sobredosis:** Los síntomas observados después de una sobredosis de cetirizina están principalmente asociados con efectos sobre el SNC o con efectos que podrían sugerir un efecto anticolinérgico. En dosis prolongadas, los simpaticomiméticos pueden inducir una psicosis tóxica con delirio y alucinaciones. Algunos pacientes pueden desarrollar arritmias cardiacas, colapso circulatorio, convulsiones, coma o fracaso respiratorio, que puede ser letal. La sobredosis aguda con cetirizina-pseudoefedrina puede producir diarrea, mareos, fatiga, dolor de cabeza, malestar general, midriasis, retención urinaria, taquicardia, arritmia cardiaca, hipertensión arterial o signos de depresión (sedación, apnea, inconsciencia, cianosis y colapso cardiovascular) o de estimulación (insomnio, alucinaciones, temblor, crisis epilépticas) del SNC, que pueden ser fatales. El tratamiento de la sobredosis, preferiblemente en el hospital, debe ser sintomático y de sostén, teniendo en consideración cualquier otra medicación ingerida concomitantemente. Deberá inducirse el vómito si éste no se ha producido espontáneamente. Se recomienda lavado gástrico. No existen antídotos conocidos. No deben usarse aminas simpaticomiméticas. La hipertensión y la taquicardia pueden controlarse con el uso de bloqueantes alfa-adrenérgicos y/o bloqueantes beta-adrenérgicos. Las crisis epilépticas pueden tratarse con diazepam intravenoso (o con diazepam vía rectal en niños). Cetirizina y pseudoefedrina se eliminan poco por hemodiálisis. **DATOS FARMACÉUTICOS: Incompatibilidades:** No se conocen incompatibilidades. **Periodo de validez:** 3 años. **Precauciones especiales de conservación:** No requiere condiciones especiales de conservación. **Naturaleza y contenido del envase:** Los comprimidos se acondicionan en blisters termoformados de PVC/aluminio. Lámina de PVC: transparente, no plastificada y fisiológicamente inerte. Lámina de aluminio: cara interior con laca termosellante de PVC, cara exterior con laca protectora incolora. Cada envase de la especialidad contiene 14 comprimidos de liberación prolongada. **Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones:** Ninguna especial. **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** LÁCER, S.A., Sardenya, 350, 08025 Barcelona (España). **NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** 62103. Medicamento no sujeto a prescripción médica. **FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN:** Mayo 2003. **FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO:** Junio 2017.

THROMBOCID

NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Thrombocid 1 mg/g pomada. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Cada gramo de pomada contiene: Pentosano polisulfato sódico 1 mg. Excipientes: Alcohol cetoestearílico 106,7 mg, Cetoestearilo sulfato sódico (E540i), Aceite de ricino polioxietilenado 9 mg, Butil hidroxianisol (E320) 0,012 mg, Ácido cítrico (E330), Oleato de decilo, Sorbitol (E420i), Propilenglicol 7,5 mg, Ácido sórbico (E200)
2 mg, Parahidroxibenzoato de etilo (E214) 1,16 mg, Parahidroxibenzoato de propilo (E216) 0,44 mg, Guayazuleno, Timol, Agua. **FORMA FARMACÉUTICA:** Pomada. **DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas:** Tratamiento local sintomático de los trastornos venosos superficiales como pesadez y tirantez en piernas con varices en adultos y de hematomas superficiales producidos por golpes, en adultos y niños mayores de 1 año. **Posología y forma de administración:** Uso cutáneo. Adultos y niños mayores de 1 año: aplicar 3 o 4 veces al día una fina capa de pomada en la zona afectada, distribuyéndola con un suave masaje. No es necesario cubrir con un vendaje, pero puede cubrirse con una gasa o compresa si es necesario. Niños menores de 1 año: dado que no se

han realizado estudios sobre seguridad y eficacia en niños menores de 1 año, no se recomienda su uso en éstos. Si los síntomas persisten más de 5 días o se produce irritación o empeoramiento, deberá evaluarse la situación clínica del paciente. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Pacientes con manifestaciones hemorrágicas o alteraciones importantes de la hemostasia. No aplicar nunca sobre las mucosas, úlceras y heridas abiertas o infectadas. **Advertencias y precauciones especiales de empleo:** Utilizar sólo en piel intacta. Evitar el contacto con los ojos. En caso de problemas venosos de origen trombótico (como por ejemplo tromboembolismo) se recomienda aplicar el producto suavemente y sin masaje. No utilizar de forma prolongada ni en zonas muy extensas de la piel. Valorar situación clínica si el paciente sufre de alguna otra dolencia, es alérgico o está utilizando algún otro medicamento. ***Advertencias sobre excipientes:*** Este medicamento puede causar reacciones en la piel porque contiene aceite de ricino polioxietilenado. Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetoestearílico y ácido sórbico. Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) o irritación de los ojos y membranas mucosas porque contiene butilhidroxianisol. Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de etilo (E214) y parahidroxibenzoato de propilo (E216). Este medicamento puede producir irritación de la piel porque contiene Propilenglicol. **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:** Aunque no se ha descrito hasta el momento ninguna interacción medicamentosa con el uso cutáneo de este medicamento, el médico o farmacéutico debe valorar su utilización conjunta con otros fármacos aplicados por esta vía. **Fertilidad, embarazo y lactancia:** Puesto que no existe una experiencia clínica adecuada sobre la seguridad del pentosano polisulfato sódico por vía tópica durante el embarazo y la lactancia, se recomienda no utilizarlo en estas situaciones salvo mejor criterio médico. **Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:** La influencia de Thrombocid sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. **Reacciones adversas:** Se han descrito reacciones alérgicas ocasionales. *Clasificación de órganos:* Trastornos del sistema inmunológico. *Frecuencia estimada:* Muy Raros (<1/10.000). *Efectos adversos:* Hipersensibilidad. En caso de observar la aparición de reacciones adversas, se deben notificar a los sistemas de Farmacovigilancia y, si fuera necesario, suspender el tratamiento. **Sobredosis:** En el caso de sobredosificación por vía tópica, pueden aparecer signos de irritación de la piel o producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto)En el caso de ingestión accidental del contenido del tubo, se recomienda beber una buena cantidad de agua u otro líquido acuoso y, si aparecieran trastornos digestivos, acudir a un centro hospitalario y aplicar tratamiento sintomático. **DATOS FARMACÉUTICOS: Incompatibilidades:** No procede. **Periodo de validez:** 3 años. **Precauciones especiales de conservación:** Mantener el tubo perfectamente cerrado. **Naturaleza y contenido del envase:** Tubo de aluminio conteniendo 30 y 60 g de pomada. Envase clínico conteniendo 100 tubos de 60 g de pomada. **Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones:** La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** LACER, S.A., C/. Sardenya, 350, 08025 Barcelona. **NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** 32762. Medicamentos no sujeto a prescripción médica. **FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN:** 26 de Octubre 1959. **FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO:** Octubre 2001.

THROMBOCID FORTE

NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Thrombocid Forte 5 mg/g pomada. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Cada gramo de pomada contiene: Pentosano polisulfato sódico 5 mg. Excipientes: Alcohol cetoestearílico 144 mg. Propilenglicol 50 mg. Parahidroxibenzoato de metilo (E218) 1,3 mg. Parahidroxibenzoato de etilo (E214) 1,3 mg. Ver epígrafe lista de excipientes. **FORMA FARMACÉUTICA:** Pomada de color blanco. **DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas:** Tratamiento local sintomático de los trastornos venosos superficiales como pesadez y tirantez en piernas con varices en adultos y de hematomas superficiales producidos por golpes, en adultos y niños mayores de 1 año. **Posología y forma de administración:** Uso cutáneo. Adultos y niños mayores de 1 año: aplicar 3 o 4 veces al día una fina capa de pomada a lo largo de la zona afectada, distribuyéndola con un suave masaje. De ordinario no hace falta vendaje, pero puede cubrirse con una gasa o compresa si es necesario. Niños menores de 1 año: no se haestablecido la seguridad y eficacia de Thrombocid Forte en niños menores de 1 año. Si los síntomas persisten más de 5 días o se produce irritación o empeoramiento, deberá evaluarse la situación clínica del paciente. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquiera de los componentes de este medicamento. Pacientes con manifestaciones hemorrágicas o alteraciones importantes de la hemostasia. No aplicar nunca sobre las mucosas, úlceras y heridas abiertas o infectadas. **Advertencias y precauciones especiales de empleo:** Utilizar sólo en piel intacta. Evitar el contacto con los ojos. En caso de problemas venosos de origen trombótico (como por ejemplo tromboembolismo) se recomienda aplicar el producto suavemente y sin masaje. No utilizar de forma prolongada ni en zonas muy extensas de la piel. Valorar situación clínica si el paciente sufre de alguna otra dolencia, es alérgico o está utilizando algún otro medicamento. **Advertencias sobre excipientes:** Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetoestearílico. Este medicamento puede producir irritación de la piel porque contiene propilenglicol. Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de metilo (E218) y parahidroxibenzoato de etilo (E214). **Interacciones con**

otros medicamentos y otras formas de interacción: Aunque no se ha descrito hasta el momento ninguna interacción medicamentosa con el uso cutáneo de este medicamento, el médico o farmacéutico deberían valorar su utilización conjunta con otros fármacos aplicados por esta vía. **Fertilidad, embarazo y lactancia:** No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de pentosano polisulfato sódico en mujeres embarazadas o en período de lactancia. Los estudios realizados en animales son insuficientes en términos de toxicidad para la reproducción. No se recomienda utilizar Thrombocid Forte durante el embarazo. **Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:** La influencia de Thrombocid Forte sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. **Reacciones adversas:** Se han notificado las siguientes reacciones adversas. Se muestran de acuerdo a MedDRA, Clasificación Órgano-Sistema y por frecuencia estimada. Las frecuencias se definen como: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100, <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000, <1/100); raras (≥1/10.000, <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Clasificación de órganos: Trastornos del sistema inmunológico. Frecuencia estimada: Muy rara. Efectos adversos: Hipersensibilidad. En caso de observarse la aparición de reacciones adversas debe suspenderse el tratamiento y notificarlas a los sistemas de Farmacovigilancia. **Sobredosis:** Siguiendo correctamente las instrucciones descritas en las indicaciones y la posología, es muy difícil que aparezcan signos o síntomas de intoxicación. En el caso de ingestión accidental del contenido del tubo, se recomienda beber una buena cantidad de agua u otro líquido acuoso y, si aparecieran trastornos digestivos, acudir a un centro hospitalario y aplicar tratamiento sintomático. **DATOS FARMACÉUTICOS:** Lista de excipientes: Alcohol cetoestearílico, Cetomacrogol 1000, Glicerol (E422), Propilenglicol, Oleato de decilo, Fenoxietanol, Parahidroxibenzoato de metilo (E218), Parahidroxibenzoato de etilo (E214), Agua. **Incompatibilidades:** No procede. **Naturaleza y contenido del envase:** Tubos de aluminio conteniendo 60 g y 100 g de pomada. **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** LACER, S.A., C/. Sardenya, 350, 08025 Barcelona (España). Medicamento no sujeto a prescripción médica. **FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Noviembre 2001.**

ANSO

NOMBRE DEL MEDICAMENTO: ANSO pomada rectal. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Cada gramo de pomada contiene: Lidocaína hidrocloruro, 20 mg, (2%), Pentosano polisulfato sodio, 10 mg (1%), Triamcinolona acetónido, 0,1 mg (0,01%). Excipientes: Alcohol cetoestearílico 146,7 mg, Cetoestearilsulfato de sodio, Aceite de ricino, polioxietilenado 11,25 mg, Butilhidroxianisol (E320) 0,018 mg, Ácido cítrico (E330), Macrogol éter cetoestearílico, Oleato de decilo, Etil parahidroxibenzoato de sodio (E215) 1,5 mg, Metil parahidroxibenzoato de sodio (E219) 2 mg, Hexilresorcinol , Sorbitol (E420), Propilenglicol 7,5 mg, Edetato disódico, Timol, Hexetidina, Agua purificada. **FORMA FARMACÉUTICA:** Pomada rectal. **DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas:** Tratamiento local sintomático de las manifestaciones asociadas con hemorroides, como la inflamación, el dolor, el picor o el escozor. Anso pomada está indicado en adultos mayores de 18 años. **Posología y forma de administración:** Posología: Adultos mayores de 18 años: Aplicar de 1 a 3 veces al día una cantidad de pomada equivalente a 1-2 cm sobre el área a tratar. Forma de administración: Uso anal y/o rectal. Se recomienda hacer las aplicaciones después de la evacuación intestinal y aseo personal. Previamente a la aplicación debe limpiarse con cuidado la zona afectada con agua templada y jabón. Se aplicará un volumen de pomada en la región anal con un dedo, utilizando la punta del dedo para vencer la resistencia del esfínter. Si la pomada se ha de aplicar en el interior del recto, se enrosca en el tubo el aplicador adjunto y se inserta la punta en el ano. A continuación, se puede aplicar una pequeña cantidad de pomada ejerciendo una ligera presión sobre el tubo. Si los síntomas se agravan o persisten a los 7 días de tratamiento, se debe revisar la situación clínica. *Población pediátrica:* No se dispone de datos. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a los principios activos, a los anestésicos locales de tipo amida, a los compuestos relacionados con pentosano polisulfato sodio o a alguno de los excipientes. Hemorragia hemorroidal. Infecciones bacterianas, víricas (ej., herpes) o fúngicas de la región a tratar. **Advertencias y precauciones especiales de empleo:** En caso de irritación en la zona de aplicación, deberá suspenderse el empleo de la pomada y, si es necesario, se instaurará tratamiento adecuado. En caso de que la mucosa esté irritada, infectada o herida, aumenta el riesgo de absorción sistémica y la toxicidad. Evitar el contacto con los ojos y zonas próximas a los mismos, así como con otras mucosas. Se aconseja lavarse bien las manos después de la aplicación. La aplicación de dosis excesivas o durante periodos prolongados, o bien con oclusión o pañales, puede dar lugar a que se presenten efectos sistémicos (hipertensión, síndrome de Cushing) debido a la mayor cantidad absorbida (ver reacciones adversas). Si se presenta una infección asociada, conviene incorporar tratamiento específico complementario. De no tener lugar una rápida mejoría, debe suspenderse el tratamiento hasta que se haya controlado la infección. Se debe tener precaución en caso de administración conjunta con medicamentos como anticoagulantes y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), ya que podría aumentar el riesgo de sangrado por efectos aditivos, aunque no se ha evidenciado en Anso pomada rectal como riesgo identificado durante la experiencia postcomercialización. Se recomienda precaución en ancianos, enfermos con una mucosa gravemente traumatizada o debilitados, ya que pueden ser más sensibles a los efectos sistémicos de los principios activos del medicamento. Advertencias sobre excipientes: Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol cetoestearílico y butilhidroxianisol (E320) y además irritación de los ojos y membranas mucosas porque contiene butilhidroxianisol (E320). Puede producir reacciones alérgicas

(posiblemente retardadas) porque contiene etil parahidroxibenzoato de sodio (E215) y metil parahidroxibenzoato de sodio (E219); así como irritación en la piel porque contiene propilenglicol. Puede causar reacciones en la piel porque contiene aceite de ricino polioxietilenado. Advertencia a los deportistas: Se debe informar a los deportistas que este medicamento contiene un componente (triamcinolona) que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo. *Población pediátrica:* No se debe utilizar Anso pomada rectal en niños y adolescentes, ya que no se han realizado estudios clínicos con éstos. Los niños son más susceptibles a padecer toxicidad sistémica inducida por corticosteroides exógenos a dosis equivalentes que los adultos, y por tanto son más susceptibles a la toxicidad de Anso pomada rectal. Son más suceptibles a la supresión del eje hipotálamo-hipófisis-suprerrenal y síndrome de Cushing que los adultos. La administración de corticosteroides tópicos en niños, en su caso, se debe limitar a la menor cantidad clínicamente eficaz y no se deben usar materiales ajustados como algunos pañales que causan oclusión. **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:** La lidocaína debe administrarse con precaución en pacientes que están siendo tratados con fármacos antiarrítmicos. Como consecuencia de la absorción de la triamcinolona acetónido, los tratamientos con dosis excesivas o los de larga duración podrían dar lugar a interacciones similares a aquellas que se producen con el tratamiento sistémico. Hasta el momento no se conocen. **Fertilidad, embarazo y lactancia:** Embarazo: No existen datos suficientes sobre la utilización de lidocaína ni triamcinolona acetónido en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Los estudios realizados en animales con corticosteroides han mostrado toxicidad para la reproducción. El uso de Anso pomada rectal durante el embarazo debería reservarse para casos en los que el beneficio potencial fuera superior al posible riesgo para el feto o el recién nacido. En cualquier caso, no debe usarse en grandes cantidades o durante largos periodos de tiempo en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Lactancia: Lidocaína se excreta en la leche materna. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con Anso pomada rectal tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre. **Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:** La influencia de Anso pomada rectal sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. **Reacciones adversas:** Los efectos adversos que podrían producirse se deben fundamentalmente a un uso inadecuado, como dosis superiores a las recomendadas o con más frecuencia de la recomendada o uso en condiciones oclusivas. Los efectos adversos se clasifican por órganos y sistemas y por frecuencias de acuerdo con la convención MedDRA. Las frecuencias se definen como: poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1.000), muy raras (<1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). *Sistema de Clasificación de órganos:* 1) Transtornos del sistema inmunológico. *Frecuencia no conocida:* Hipersensibilidad con reacción alérgica y reacciones anafilácticas a la lidocaína que podrían producir angioedema, broncoespasmo, dermatitis, disnea, laringoespasmo, prurito, shock y urticaria. Dermatitis de contacto. 2) Transtornos de la piel y del tejido subcutáneo. *Poco frecuentes:* Pueden aparecer reacciones adversas de carácter local, como quemazón en la zona de aplicación, picor e irritación en el sitio de aplicación (más frecuentemente en caso de oclusión). *Raras:* Atrofia cutánea, telangiectasia, estrías en la piel, erupciones acneiformes, dermatitis perioral, eritema, hipopigmentación de la piel . *Frecuencia no conocida:* Sequedad, maceración dérmica, etc. Podrían producirse efectos adversos sistémicos debidos a la absorción de los corticosteroides cuando se usan en exceso, durante periodos prolongados, con oclusión o en niños; se podría producir supresión reversible del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal con manifestaciones de síndrome de Cushing (obesidad en el tronco, cara redondeada, acumulación de grasa en la zona cervical, retraso en la cicatrización, síntomas psiquiátricos, etc.) hipertensión, edema, cataratas (subcapsular), alopecia. Los niños son más sensibles a los efectos adversos de la lidocaína. **Sobredosis:** Una sobredosificación de corticosteroides (cantidades superiores a las recomendadas) aumenta el riesgo de efectos adversos y podría causar los efectos sistémicos de los mismos (ver reacciones adversas). En caso de aplicación excesiva de lidocaína, si se utiliza sobre áreas extensas de piel, con vendaje oclusivo o en piel irritada o herida, o si la temperatura de la piel aumenta, la cantidad de anestésico que se absorbe sistémicamente es impredecible y podrían aparecer reacciones graves como latidos irregulares, convulsiones, dificultad respiratoria. En caso de ingestión accidental del contenido del tubo, se recomienda realizar tratamiento sintomático. **DATOS FARMACÉUTICOS: Incompatibilidades:** No procede. **Periodo de validez:** 5 años. **Precauciones especiales de conservación:** Mantener el tubo perfectamente cerrado. **Naturaleza y contenido del envase:** Caja de cartón conteniendo tubo de aluminio con boquilla, tapón de rosca y cánula de polietileno con 50 g de pomada. **Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones:** La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** LACER, S.A., C/. Sardenya, 350, 08025 Barcelona (España). **NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** 51967. Medicamentos no sujeto a prescripción médica. **FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN:** 17/01/1974. **FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO:** 09/2016.

LACER, S.A.
C/ dels Boters, 5
Parc Tecnologic del Vallés
08290 Cerdanyola del Vallès

www.lacer.es
www.laceroralhealth.com
www.pilexil.com
www.thrombocid.com
www.talquistina.com
www.ansohemorroides.com

PN/VAD-26